

REBLOZYL® (luspatercept) PATIENTKORT

Detta patientkort är till för fertila kvinnor.

Till patienter:

Reblozyl (luspatercept) ska inte användas under graviditet och ska ha avslutats minst tre (3) månader innan du försöker bli gravid. Reblozyl kan skada det ofödda barnet.

Använd inte Reblozyl om du är gravid eller ammar, eller kan bli gravid och inte använder minst en mycket effektiv preventivmetod.

Före behandlingsstart:

- Du måste lämna ett negativt graviditetstest som bekräftas av din läkare.
- Din läkare kommer att gå igenom effektiva preventivmetoder med dig. Du måste använda minst en mycket effektiv preventivmetod under tiden som du använder Reblozyl och i minst tre (3) månader efter avslutad behandling.

Under och efter behandlingen:

Graviditetstest måste upprepas med lämpliga intervall under behandlingen med Reblozyl.

Berätta omedelbart för din läkare om du blir gravid eller tror att du kan vara gravid under behandlingen med Reblozyl och under tre (3) månader efter avslutad behandling med Reblozyl.

För mer information, se REBLOZYL bipacksedel (www.ema.europa.eu) eller ring Bristol Myers Squibb Medicinsk Information på 09-25121244.

För att få ett nytt patientkort, vänligen kontakta din läkare eller besök www.fimea.fi.

Misstänkta biverkningar skall rapporteras till:

Fimea: www.fimea.fi eller Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret, PB 55, 00034 FIMEA eller

Bristol Myers Squibb Medicinsk Information: på telefonnummer 09-25121244 eller medinfo.finland@bms.com.

Jag har blivit ordinerad behandling med Reblozyl.

Kontaktuppgifter till min läkare (förskrivare):

Läkarens namn:

Mottagning:

Mottagningens telefonnummer:

För mer information till sjukvårdspersonal, se REBLOZYL produktresumé www.ema.europa.eu eller ring Bristol Myers Squibb Medicinsk Information på 09-25121244.