

Allergiat:

Luettelo muista käytössä olevista lääkkeistä:

Varmista, että sinulla on mukana luettelo kaikista muista käyttämästäsi lääkkeistä, kun menet vastaanotolle.

Remicade-hoito aloitettu

Annetut infuusiot

FI-NON-00770 12.4.2022

Pyydä lääkäriä merkitsemään tähän tiedot viimeisimmästä tuberkuloosiseulonnasta:

Päiväys

Menetelmä:

Tulos:

Päiväys

Menetelmä:

Tulos:

FI-NON-00770 12.4.2022

# Potilaskortti



Potilaan nimi:

Lääkärin nimi:

Lääkärin puh.nro:

FI-NON-00770 12.4.2022

Tämä potilaskortti sisältää tärkeää turvallisuuteen liittyvää tietoa, josta sinun on hyvä olla tietoinen ennen Remicade-hoidon aloitusta ja sen aikana.

Näytä tämä kortti kaikille hoitoosi osallistuville lääkäreille.

## INFEKTIOT

### Ennen Remicade-hoitoa

- Kerro lääkärille, jos sinulla on jokin infektio, vaikka se olisi hyvin vähäinenkin.
- On erittäin tärkeää, että kerrot lääkärille, jos sinulla on joskus ollut tuberkuloosi tai jos olet joskus ollut läheisessä kontaktissa henkilön kanssa, jolla on ollut tuberkuloosi. Sinulle tehdään tuberkuloosin seulontakokeet. Pyydä, että lääkäri merkitsee tiedot seulontakokeista tähän korttiin.
- Kerro lääkärille, jos sinulla on B-hepatiitti tai jos tiedät tai epäilet olevasi B-hepatiittiviruksen kantaja.

### Remicade-hoidon aikana

- Kerro heti lääkärille, jos sinulle ilmaantuu infektio-oireita, kuten kuumetta, väsymystä, (itsepintaista) yskää, hengenhdistusta, painon alenemista, yöhikoilua, ripulia, haavaumia, hammassongelmia, kirvelyä virtsatessa tai flunssan kaltaisia oireita.

FI-NON-00770 12.4.2022

## RASKAUS, IMETYS JA ROKOTUKSET

- Jos olet saanut Remicadea raskauden aikana tai jos imetät, on tärkeää että kerrot siitä lastasi hoitavalle lääkärille, ennen kuin lapsesi saa mitään rokotuksia. Lapsellesi ei saa antaa "elävää rokotetta", kuten BCG-rokotetta (käytetään tuberkuloosin ehkäisyyn) 12 kuukauteen syntymän jälkeen tai imetyksen aikana ellei lastasi hoitava lääkäri toisin suosittele.

Pidä tämä kortti mukanasasi 4 kuukauden ajan viimeisimmän Remicade-annoksen jälkeen, tai jos olet raskaana, 12 kuukauden ajan synnytyksen jälkeen. Haittavaikutuksia voi ilmaantua pitkänkin ajan kuluttua viimeisestä annoksesta.

Lue Remicaden pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. On tärkeää, että sinä ja lääkäri merkitsette muistiin lääkkeesi kaupanimen ja eränumeron.

FI-NON-00770 12.4.2022



Copyright © 2022 MSD Finland Oy. All rights reserved. FI-NON-00770 12.4.2022

FI-NON-00770 12.4.2022