

RIXATHON (RITUKSIMABI) -POTILASKORTTI MUIHIN KUIN ONKOLOGISIIN KÄYTTÖAIHEISIIN

Miksi minulle on annettu tämä kortti?

Tämän lääkkeen käytön aikana voit saada infektoita tavanomaista herkemmin. Tässä kortissa kerrotaan

- mitä sinun on tiedettävä ennen Rixathon-hoidon saamista
- millaisia infektion oireet ovat
- mitä sinun on tehtävä, jos epäilet saaneesi jonkin infektion.

Kortin kääntöpuolella on myös sinun nimesi ja lääkärin nimi ja puhelinnumero.

RIXATHON[®]
rituksimabi



Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

MITÄ TEEN TÄLLÄ KORTILLA?

- Pidä kortti aina mukasi esimerkiksi lompakossa tai käsilaukussa.
- Näytä korttia aina lääkärin, sairaanhoitajan tai hammaslääkärin vastaanotokäynneillä, ei pelkästään Rixathon-hoidon määränneen lääkärin vastaanotolla.

Pidä kortti mukasi vielä kahden vuoden ajan viimeisen Rixathon-annoksen saamisen jälkeen, koska haittavaikutuksia voi kehittyä vielä useita kuukausia hoidon jälkeenkin.

MILLOIN MINULLE EI PIDÄ ANTAA RIXATHON-HOITOA?

Sinulle ei saa antaa Rixathon-hoitoa, jos sinulla on jokin aktiivinen infektio tai vakava elimistön immuunipuolustusjärjestelmän häiriö.

Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan käytät tai olet aiemmin käyttänyt lääkkeitä, kuten solunsalpaajahoitoa, jotka saattavat vaikuttaa elimistösi immuunipuolustusjärjestelmään.

MILLAISIA INFEKTION OIREET OVAT?

Tarkkaile seuraavia mahdollisia infektion oireita:

- kuume tai jatkuva yskä
- laihtuminen
- kipu, vaikka et ole satuttanut itseäsi
- yleinen sairauden tai haluttomuuden tunne.

Jos sinulle ilmaantuu jotakin näistä oireista, ota heti yhteyttä lääkäriin tai sairaanhoitajaan. Kerro heille myös, että saat Rixathon-hoitoa.

MITÄ MUUTA MINUN ON SYYTÄ TIETÄÄ?

Rixathon voi aiheuttaa harvinaisissa tapauksissa vakavan aivoinfektion, jota kutsutaan **progressiiviseksi multifokaaliseksi leukoenkefalopatiaksi** eli PML:ksi. Se voi johtaa kuolemaan.

PML:n oireita ovat

- sekavuus, muistamattomuus tai ajattelun vaikeus
- tasapainovaikeudet tai kävely- tai puhutavan muutokset
- kehon toispuoleinen voimattomuus tai voimien heikkeneminen
- näön sumeneminen tai näkökyvyn häviäminen.

Jos sinulle ilmaantuu jotakin näistä oireista, ota heti yhteyttä lääkäriin tai sairaanhoitajaan. Kerro heille myös, että saat Rixathon-hoitoa.

Mistä saan lisää tietoa?

Lisätietoja saat Rixathonin pakkausselosteesta.

Hoidon aloituspäivämäärä ja yhteystiedot

Viimeisimmän infuusion päivämäärä: _____

Ensimmäisen infuusion päivämäärä: _____

Potilaan nimi: _____

Lääkärin nimi: _____

Lääkärin yhteystiedot: _____

Pidä aina lista käyttämästäsi lääkkeistä mukana, kun käyt terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla.

Käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen, jos sinulla on tämän kortin sisältämistä tiedoista kysyttävää.

Potilasta pyydetään raportoimaan epäillyistä haittavaikutuksista Fimealle (www.fimea.fi) ja / tai Sandozille (www.sandoz.fi).