

RUCONEST® (conestat alfa)

PATIENTKORT

Risk för överkänslighet mot spår av kaninproteiner – försiktighet vid användning

Den här patienten har ordinerats RUCONEST® för behandling av akuta attacker av hereditärt angioödem. RUCONEST® är en rekombinant C1-esterashämmare, som utvinns ur mjölk från transgena kaniner och innehåller spår av kaninproteiner. Innan behandlingen med RUCONEST® påbörjas för den här patienten, ska tidigare och nuvarande medicinsk historik med allergi mot kanin utvärderas noggrant. I händelse av en känd eller misstänkt kaninallergi, ska andra behandlingsalternativ som inte kommer från kanin övervägas.

Var god följ alltid noga nedanstående rutiner vid behandling av den här patienten:

1. Övervaka patienten med avseende på kliniska tecken och symtom på överkänslighet.
2. Administrera omedelbart akutvård vid anafylaktiska reaktioner eller chocktillstånd.
3. Informera patienten om de allmänna tecknen på en överkänslighetsreaktion, t.ex. nässelutslag, generaliserad urtikaria, tryck över bröstet, väsljud, hypotoni och anafylaxi, och om att kontakta sjukvården om något av dessa symtom uppstår. Diskutera med patienten vilken skillnaden är från en hereditär angioödem-attack.
4. Informera regelbundet patienten att genast rapportera allergiska reaktioner mot kanin.
5. Be patienten att han/hon alltid bär med sig detta kort och visar upp det för den sjukvårdspersonal som behandlar honom/henne för akuta attacker av hereditärt angioödem.
6. Rapportera alla misstänkta överkänslighets-/immunologiska biverkningar.

Mer information finns att läsa i utbildningsmaterialet och i produktresumén (SmPC), eller kontakta innehavaren av marknadsföringstillståndet för RUCONEST® på medinfo.se@pharming.com.

Jag har en sjukdom som heter hereditärt angioödem (HAE)

Patientens namn

Personnummer

Vikt

Min HAE-specialist eller -vårdgivare är

Namn

Telefon

Jag har fått diagnosen hereditärt angioödem (HAE), som yttrar sig som återkommande, ödematösa attacker orsakade av en brist på endogen C1-esterashämmare. Om jag inte erhåller korrekt behandling, kan HAE-attackerna allvarligt påverka mitt hälsotillstånd om den ödematösa svullnaden uppstår i t.ex. orofarynx och larynx.

Jag kan endast behandlas med RUCONEST® om jag inte har någon känd eller misstänkt kaninallergi.

Uppsök din läkare om du tror att du har utvecklat en allergi mot kaniner. Läs också den ytterligare information som finns i bipacksedeln.

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i bipacksedeln. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet

Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Godkänt av Fimea 13.11.2020

2020/NP-FI-006

