

Potilaan nimi:

Lääkärin nimi:

Lääkärin puh.no:

**Tämä potilaskortti sisältää tärkeää turvallisuuteen liittyvää tietoa, josta sinun täytyy olla tietoinen ennen Simponi-hoidon aloitusta ja sen aikana.**

**Näytä tämä kortti kaikille hoitoosi osallistuville lääkäreille.**

FI-NON-00053/30.10.2019

### 3. SIMPONI-hoidon päivämäärät (golimumabi)

1. annos:

/ /

Seuraavat annokset:

/ /

/ /

/ /

On tärkeää, että sinä ja lääkärisi kirjaatte lääkevalmisteesi kaupanimen ja eränumeron.

FI-NON-00053/30.10.2019

### 4. MUUTA TIETOA

- Varmista, että sinulla on mukana luettelo kaikista muista käyttämästäsi lääkkeistä aina, kun menet vastaanotolle.
- Pidä tämä kortti mukanasasi 6 kuukauden ajan viimeisen Simponi-annoksen jälkeen, sillä haittavaikutuksia voi ilmaantua pitkänkin ajan kuluttua viimeisestä annoksesta.
- Lue Simponin pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.



Copyright © 2019 MSD Finland Oy. All rights reserved.  
FI-NON-00053/30.10.2019

# SIMPONI potilaskortti



FI-NON-00053/30.10.2019

## 1. INFEKTIOT

Kun sinua hoidetaan Simponi-valmisteella, saatat saada infektioita herkemmin. Infektiot saattavat edetä nopeammin ja ne voivat olla vaikeampia. Lisäksi jokin aiempi infektio saattaa ilmaantua uudelleen.

### 1.1. Ennen Simponi-hoitoa

- Kerro lääkärille, jos sinulla on jokin infektio. Sinua ei pidä hoitaa Simponi-valmisteella, jos sinulla on tuberkuloosi tai jokin muu vaikea infektio.
- Sinulle tehdään tuberkuloosin seulontakokeet. On erittäin tärkeää, että kerrot lääkärille, jos sinulla on joskus ollut

FI-NON-00053/30.10.2019

tuberkuloosi tai jos olet joskus ollut läheisessä kontaktissa henkilön kanssa, jolla on ollut tuberkuloosi.

- Kerro lääkärille, jos tiedät tai epäilet olevasi hepatiitti B -viruksen kantaja.

### 1.2. Simponi-hoidon aikana ja jälkeen

- Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos sinulle ilmaantuu infektio-oireita, kuten kuumetta, väsymystä, (itsepintaista) yskää, hengenahdistusta tai flunssan kaltaisia oireita, painon alenemista, yöhikoilua, ripulia, haavaumia, hammasongelmia tai kirvelyä virtsatessa.

FI-NON-00053/30.10.2019

## 2. RASKAUS JA ROKOTTEET

Jos olet saanut Simponia raskauden aikana, on tärkeää, että kerrot siitä lastasi hoitavalle lääkärille, ennen kuin lapsesi saa mitään rokotuksia. Lapsellesi ei saa antaa 'elävää rokotetta', kuten BCG-rokotetta (käytetään tuberkuloosin ehkäisyyn), 6 kuukauteen raskauden aikana saamasi viimeisen Simponi-injektion jälkeen.

FI-NON-00053/30.10.2019

**Pyydä lääkäriä merkitsemään tiedot tuberkuloosin seulontakokeista tähän:**

**Testi** \_\_\_\_\_

**Päiväys** \_\_\_\_\_ **Tulos** \_\_\_\_\_

**Testi** \_\_\_\_\_

**Päiväys** \_\_\_\_\_ **Tulos** \_\_\_\_\_

FI-NON-00053/30.10.2019