

Tietoja raskauden lääkkeellisestä keskeytyksestä Potilasmateriaali (Yhteystiedot-kortti mukana)

Fimean hyväksymispäivämäärä: 30.03.2022

Olet valinnut lääkkeellisen raskaudenkeskeytysmenetelmän. Tässä selosteessa pyritään antamaan sinulle tietoja hoidon eri vaiheista ja korostamaan tärkeitä asioita, jotka sinun on huomioitava.

Ennen raskauden lääkkeellistä keskeytystä:

- Lue mifepristonin ja misoprostolin pakkausselosteet
- Kerro lääkärille, jos:
 - sinulla on maksa- tai munuaissairaus
 - sinulla on anemia tai olet aliravittu
 - sinulla on sydänverisuonisairaus (sydämen tai verenkierron sairaus)
 - sinulla on kohonnut riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin Riskitekijöitä ovat yli 35-vuoden ikä, tupakointi ja korkea verenpaine, korkea kolesteroli tai diabetes
 - sinulle on aiemmin tehty keisarinleikkaus tai kohtuleikkaus

Jos tunnet olosi epämukavaksi, olet huolissasi tai jos sinulla on lisäkysymyksiä, ota yhteyttä hoitavaan lääkäriin. Lääkäri on merkinnyt alla olevaan yhteystiedot-korttiin kaikki tarvittavat yhteystiedot ja minne sinun tulee mennä, jos ongelmia ilmenee.

■ LÄÄKKEELLINEN RASKAUDEN KESKEYTYS TAPAHTUU 3 VAIHEESSA:

1. Tässä vaiheessa olet ottanut suun kautta 600 mg annoksen Mifegyne®-tabletteja (3 tablettia) 36–48 tuntia sitten.

□ □ / □ □ / □ □ □ □
P P K K V V V V

2. Seuraavaksi otat suun kautta 400 µg annoksen Topogyne®-tabletteja: 1 tabletti otetaan.
3. **2-3 viikkoa ensimmäisen lääkkeen (Mifegyne®) ottamisen jälkeen on pakollinen seurantakäynti.** Tämä seurantakäynti on tärkeä, koska lääkäri varmistaa abortin onnistumisen ja tarkistaa, että kaikki on kunnossa.

□ □ / □ □ / □ □ □ □
P P K K V V V V

■ MITÄ KOET RASKAUDEN KESKEYTYKSEN AIKANA:

- Lääkkeellinen raskauden keskeytys aiheuttaa kohdun supistuksia. Jos sinulla on kipuja, tunnet olosi väsyneeksi, voit pahoin, oksentelet ja sinulla on ripuli, on

suositeltavaa pyrkiä tekemään olo mukavaksi ja pyytää joku olemaan seurassasi. Älä epäröi ottaa kipulääkkeitä, joita lääkäri on määrännyt sinulle.

- Raskauden keskeytys ilmenee verenvuotona, joka on yleensä voimakkaampaa kuin kuukautisvuoto, sisältää verihyytymiä ja joskus näkyy geelimäisiä valkoisia palloja. Verenvuotoa voi ilmetä hyvin nopeasti Topogyne®-tablettien ottamisen jälkeen, mutta se voi tulla myös myöhemmin.
 - Sikiö voi poistua muutaman tunnin sisällä Topogyne®-tabletin ottamisesta tai muutaman seuraavan päivän sisällä.
 - Verenvuoto kestää 12 – 15 päivää Topogyne®-tabletin ottamisesta ja on yleensä vähemmän runsasta kuin normaalien kuukautistesien aikana. **Verenvuoto ei ole kuitenkaan todiste raskauden keskeytyksen onnistumisesta.**
- Hedelmällisyys palaa välittömästi raskaudenkeskeytyksen jälkeen. **Keskustele lääkärisi kanssa sinulle parhaasta ehkäisymenetelmästä ja aloita sen käyttö samana päivänä, kun raskaudenkeskeytys vahvistetaan.**

■ OTA VÄLITTÖMÄSTI YHTEYTTÄ LÄÄKÄRIISI, JOS:

- **Oksennat** 30 minuutin sisällä Topogyne®-tabletin ottamisesta. Lääkärisi päättää onko toinen lääkeannos tarpeen.
 - Sinulla on **epätavallista verenvuotoa** vuodon keston ja veren määrän osalta (yli 15 vuorokautta ja/tai käytät useamman kuin 2 terveysidettä tunnissa 2 tunnin aikana).
 - Sinulla on kovia vatsanalueen **kipuja**, jotka eivät lieviy kipulääkkeillä
 - Sinulla on **kuumetta** tai jos sinulla on kylmä ja vilunväireitä.
- Seurantakäynnin aikana lääkärisi tarkistaa, että alkion/sikiön poistuminen on täydellinen. Jos raskaudenkeskeytys epäonnistuu, epämuodostumien riskiä vastasyntyneellä ei voi sulkea pois. Ota tämä huomioon tehdessäsi päätöksen jatkatko raskautta vai et.
- Jos päätät jatkaa raskaudenkeskeytystä, siihen käytetään uutta menetelmää. Lääkärisi kertoo sinulle eri vaihtoehtoista.
 - Jos päätät jatkaa raskautta, varmista että raskauttasi seurataan huolellisesti ja sinulle tehdään säännöllisesti ultraäänitutkimuksia erikoisklinikalla.

HAITTAVAIKUTUKSISTA ILMOITTAMINEN:

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

Topogyne® (misoprostoli)

YHTEYSTIEDOT-KORTTI

Ota yhteyttä **MILLOIN TAHANSA** jos olet huolissasi tai jokin seuraavista ilmenee:

- **kuume**, joka kestää yli 24 tuntia
- **kipu**, joka ei lieviy kipuräkkeillä
- huomattava ja jatkuva **verenvuoto** (enemmän kuin 2 terveessidettä tunnissa 2 tunnin aikana)
- **heikotusta**, tai jos sinulla on kysyttävää

Ota yhteyttä lääkäriisi tai mene hoidon määränneeseen hoitopaikkaan:

Lääkäri tai erikoisklinikka



.....



.....

Tule seurantakäynnille hoitopaikkaan

/ /
P P K K V V V V

kello.....