

**TÄMÄ POTILASKORTTI ON TARKOITETTU VAIN
POTILAILLE, JOTKA KÄYTTÄVÄT METOTREKSAATTIA
SISÄLTÄVÄÄ LÄÄKETTÄ NIVELREUMAN, PSORIAASIN JA
NIVELPSORIAASIN HOITOON. JOS KÄYTÄT
METOTREKSAATTIA JONKIN EDELLÄ MAINITUN
KÄYTTÖAIHEEN HOITOON,
OTA METOTREKSAATTIA VAIN KERRAN VIIKOSSA.**

Kirjoita tähän sen viikonpäivän nimi, jolloin otat lääkkeen:

Älä ylitä määrättyä annosta.

Yliannostus voi aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia ja johtaa jopa kuolemaan. Yliannostuksen oireita ovat esimerkiksi kurkkukipu, kuume, suun haavaumat, ripuli, oksentelu, ihottumat, verenvuoto tai epätavallinen heikotus. Jos luulet ottaneesi määrättyä annosta suuremman annoksen, ota välittömästi yhteys lääkäriin.

Näytä tämä kortti aina sellaisille terveydenhuollon ammattilaisille, jotka eivät ole perehtyneet metotreksaattihoitoosi, jotta he ovat tietoisia kerran viikossa tapahtuvasta annostelusta (esim. sairaalaan mentäessä, hoidon muuttuessa).

Lue lisätiedot pakkauksessa olevasta pakkausselosteesta.

DETTA PATIENTKORT ÄR ENBART AVSETT FÖR PATIENTER SOM ANVÄNDER ETT METOTREXAT-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL FÖR REUMATOID ARTRIT, PSORIASIS OCH PSORIASISARTRIT. OM DU ANVÄNDER METOTREXAT FÖR NÅGON AV OVANSTÅENDE INDIKATIONER SKA DU TA METOTREXAT ENDAST EN GÅNG I VECKAN.

Skriv här hela namnet på veckodagen då läkemedlet ska tas:

Ta inte mer än den ordinerade dosen.

Överdoserings kan leda till allvarliga biverkningar och kan få dödlig utgång. Symtom på överdosering kan vara t ex halsont, feber, sår i munnen, diarré, kräkningar, hudutslag, blödningar eller onormal svaghet. Om du tror att du kan ha fått i dig mer än den ordinerade dosen, sök läkare omedelbart.

Visa alltid detta kort vid kontakt med vårdpersonal som inte är insatta i din metotrexatbehandling och gör dem uppmärksamma på att du tar läkemedlet en gång i veckan (t ex vid inläggning på sjukhus eller vid byte av vårdgivare).

För mer information, läs bipacksedeln som finns i förpackningen.