

LÄÄKKEEN ANTOA EDELTÄVÄ TARKISTUSLISTA
koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille, potilaille
ja potilaiden hoitajille
käytettäväksi ennen jokaista TYSABRI™-valmisteen antoa ihon alle
(S.C.) erikoissairaanhoidon ulkopuolella

TYSABRI-valmistetta saavilla potilailla on esiintynyt progressiivista multifokaalista leukoenkefalopatiaa (PML), joka on harvinainen aivoinfektio. Lääkkeen antoa edeltävä tarkistuslista on tarkoitettu PML:n merkkien ja oireiden tarkistamiseen ennen Tysabri-pistoksen pistämistä. Lääkkeen antoa edeltävää tarkistuslistaa ei ole tarkoitettu korvaamaan mitään paikallisia lääkkeen antoa edeltäviä terveystarkastuksia tai terveydenhuollon ammattilaisen tekemää seulontaa.

Ennen tämän tarkistuslistan käyttöä

- **terveydenhuollon ammattilaisten** on luettava ihon alle (s.c.) annettavan TYSABRI-valmisteen valmisteyhteenveto ja terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitetut täydentävät tiedot
- **potilaiden ja heidän hoitajiensa** on luettava pakkausseloste ja potilaan seurantakortti.

LÄÄKKEEN ANTOA EDELTÄVÄ TARKISTUSLISTA			
Nro	KYSYMYS	JOS VASTAUS MIHIN TAHANSA KYSYMYKSEEN ON KYLLÄ	JOS VASTAUS KAIKKIIN KYSYMYKSIIN ON EI
1	Onko sinulla ollut edellisen TYSABRI-annoksen jälkeen jotain seuraavassa mainituista uutena oireena tai seuraavassa mainittujen pahenemista? • henkisen toimintakyvyn ja keskittymiskyvyn muutokset • käyttäytymisen muutokset • kehon toispuolinen heikkous • näköhäiriöt • uudet, sinulle epätavalliset aivoihin tai hermostoon liittyvät oireet.	 ÄLÄ pistä TYSABRI- valmistetta ihon alle (s.c.) Ota välittömästi yhteyttä erikoislääkäriin.	 Voit pistää TYSABRI- valmisteen ihon alle (s.c.)
2	Onko sinulla edellisen TYSABRI-annoksen jälkeen todettu jokin uusi sairaus tai onko sinulle tehty jokin leikkaus, joka voi heikentää immuunijärjestelmääsi?		
3	Oletko edellisen TYSABRI-annoksen jälkeen ottanut uusia lääkkeitä multippeliskleroosin (MS-taudin) hoitoon tai ottanut muita lääkkeitä, jotka voivat heikentää immuunijärjestelmää?		