

CHECKLISTA FÖRE ADMINISTRERING
 utbildningsmaterial för sjukvårdspersonal, patienter och
 anhöriga/vårdgivare
 ska användas före varje administrering av TYSABRI™ subkutant (s.c.)
 utanför specialistsjukvård

PML, som är en sällsynt hjärninfektion, har förekommit hos patienter som fått TYSABRI. Syftet med checklistan före administrering är att gå igenom tecken och symtom på PML innan Tysabri injiceras. Denna checklista före administrering är inte avsedd att ersätta lokala hälsokontroller eller screening utförda av hälso- och sjukvårdspersonal före administrering.

Innan checklistan används:

- **hälso- och sjukvårdspersonal** ska gå igenom produktresumén för TYSABRI s.c. och tilläggsinformation för sjukvårdspersonal
- **patienter och anhöriga/vårdgivare** ska läsa bipacksedeln och patientinformationskortet.

CHECKLISTA FÖRE ADMINISTRERING			
NR	FRÅGA	OM JA PÅ <u>NÅGON</u>	OM NEJ PÅ <u>ALLA</u>
1	Sedan din senaste dos av TYSABRI, har du haft några nya eller förvärrade symtom av följande slag? • Förändringar i mental förmåga och koncentration • Beteendeförändringar • Svaghet i ena sidan av kroppen • Synstörningar • Nya hjärn- eller nervrelaterade symtom som du inte känner igen	 Injicera INTE TYSABRI s.c.	 Du kan injicera TYSABRI s.c.
2	Sedan din senaste dos av TYSABRI, har du diagnostiserats med en ny sjukdom eller genomgått en operation som kan försvaga immunsystemet?	Kontakta omedelbart specialistläkaren.	
3	Sedan din senaste dos av TYSABRI, har du tagit nya läkemedel för multipel skleros (MS) eller några andra läkemedel som kan försvaga immunsystemet?		