

## MITÄ PITÄÄ TEHDÄ ENNEN AGOMELATIINIHOIDON ALOITTAMISTA?

- Kerro lääkärille, jos tiedät, ettei maksasi toimi kunnolla. Älä silloin ota agomelatiinia.
- On myös muita syitä, miksi agomelatiini ei välttämättä sovi sinulle.

Kysy lääkäriltä neuvoa seuraavista:

- jos sinulla on joskus ollut maksan toimintahäiriötä
- jos olet ylipainoinen
- jos sairastat diabetesta
- jos käytät alkoholia
- jos käytät muita lääkkeitä (joidenkin lääkkeiden tiedetään vaikuttavan maksaan).

## MITEN VOIT VÄLTTÄÄ MAKSAN TOIMINTAHÄIRIÖT HOIDON AIKANA?

### ► Käy säännöllisesti verikokeissa

#### • Miksi?

Lääkäri on todennäköisesti tutkinut **ennen hoidon aloittamista**, että maksasi toimii kunnolla. Lääkäri selvittää määräämiensä verikokeiden avulla, **miten maksasi toimii** ja sopiiko agomelatiinihoito sinulle.

Veren maksaentsyymipitoisuudet saattavat suurentua agomelatiinihoidon aikana. Maksaentsyymipitoisuudet kertovat, toimiiko maksasi kunnolla, ja niiden seuraaminen on välttämätöntä hoidon aikana.

#### • Milloin?

#### Verikokeet

	Ennen hoidon aloittamista tai annosta suurennettaessa	Noin 3 viikon kuluttua	Noin 6 viikon kuluttua	Noin 3 kuukauden kuluttua	Noin 6 kuukauden kuluttua
Verikokeet	✓	✓	✓	✓	✓

**Jos lääkäri suurentaa annostuksesi 50 mg:aan, kokeet pitää tehdä uudelleen.**

Muista ottaa potilasoppaan **MUISTUTUSSIVU VERIKOKEISTA** (ks. seuraava sivu) mukaasi lääkärin vastaanotolle.

Kerro lääkärille heti, jos saat tietää veresi maksaentsyymipitoisuuksien suurentuneen hoidon aikana.

### ► Tarkkaile maksan toimintahäiriöiden oireita

**Jos havaitset jotakin seuraavista, maksasi ei ehkä toimi kunnolla:**

- ihon tai silmien keltaisuutta
- tummaa virtsaa
- vaaleita ulosteita
- ylävatsan oikean puolen kipua
- epätavallista väsymystä (etenkin edellä mainittujen oireiden yhteydessä)

⇒ Hakeudu kiireellisesti lääkäriin. Lääkäri saattaa kehottaa sinua lopettamaan agomelatiinihoidon.

## Muistutussivu verikokeista

### ► Muista

Agomelatiinihoidon aikana on tärkeää käydä verikokeissa säännöllisesti.

**Verikokeiden ottamisajankohdat on helpompi muistaa, kun merkitset ne seuraavaan taulukkoon.**

Agomelatiini 25 mg	Päivämäärä
<b>Lääkityksen aloituspäivämäärä:</b>	
<b>Verikokeet maksaentsyymipitoisuuksien määrittämiseksi</b>	
Ensimmäisen verikokeen päivämäärä <i>(ennen hoidon aloittamista)</i>	
Toisen verikokeen päivämäärä <i>(noin 3 viikon kuluttua)</i>	
Kolmannen verikokeen päivämäärä <i>(noin 6 viikon kuluttua)</i>	
Neljännän verikokeen päivämäärä <i>(noin 3 kuukauden kuluttua)</i>	
Viidennen verikokeen päivämäärä <i>(noin 6 kuukauden kuluttua)</i>	

Lääkäri saattaa katsoa tarpeelliseksi ottaa verikokeita vielä edellä mainittujen lisäksi.

<b>Mahdollinen annoksen suurentaminen 50 mg:aan</b>	<b>Päivämäärä</b>
<b>Lääkityksen nostopäivämäärä:</b>	
<b>Verikokeet maksaentsyymipitoisuuksien määrittämiseksi</b>	
Verikoe agomelatiinin 50 mg:n annoksen käyttöä aloitettaessa	
Toisen verikokeen päivämäärä <i>(noin 3 viikon kuluttua)</i>	
Kolmannen verikokeen päivämäärä <i>(noin 6 viikon kuluttua)</i>	
Neljännän verikokeen päivämäärä <i>(noin 3 kuukauden kuluttua)</i>	
Viidennen verikokeen päivämäärä <i>(noin 6 kuukauden kuluttua)</i>	

Lääkäri saattaa katsoa tarpeelliseksi ottaa verikokeita vielä edellä mainittujen lisäksi.

Muista ottaa tämä opas mukaasi lääkärin vastaanotolle.

*Ks. lisätietoja pakkausselosteesta.*

Jos epäilet saaneesi lääkkeestä haittavaikutuksen, kerro siitä hoitavalle lääkärille. Kerro lääkärille myös kaikista samanaikaisesti käyttämistäsi lääkkeistä ja ravintolisistä, sillä niillä voi olla yhteisvaikutuksia.

Haittavaikutusilmoituksen voi tehdä myös itse:

Servier Finland Oy:n sivusto:  
[www.servierfinland.fi](http://www.servierfinland.fi)

tai

www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)  
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea  
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri  
PL 55  
00034 FIMEA

**Potilaan opas**

# AGOMELATIINI

Les Laboratoires Servier ja Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.

## Suositukses maksan haittavaikutusten välttämiseksi

**Agomelatiini voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan.**

**Tässä oppaassa kerrotaan suosituksista maksan haittavaikutusten välttämiseksi ja annetaan ohjeet, miten pitää toimia, jos agomelatiinihoidon aikana ilmaantuu tällaisia haittavaikutuksia.**

**Lisätietoja saat sinua hoitavalta lääkäriltä.**

Agomelatiini on masennuslääke, jota käytetään masennuksen hoitoon. Jotta saat lääkehoidostasi parhaan mahdollisen hyödyn, noudata lääkärin antamia ohjeita agomelatiinihoidosta (annostus, hoidon kesto, hoitoon liittyvä seuranta, kuten seurantakäynnit lääkärin vastaanotolla, verikokeet).