

VAD SKA MAN GÖRA INNAN BEHANDLING MED AGOMELATIN INLEDS?

- Tala om för läkaren om du vet att din lever inte fungerar som den ska. I så fall ska du inte ta agomelatin.
- Det finns också andra situationer där agomelatin kanske inte är lämpligt för dig.

Rådfråga läkaren:

- om du någon gång har upplevt störningar i din leverfunktion
- om du är överviktig
- om du har diabetes
- om du använder alkohol
- om du använder andra läkemedel (man känner till att vissa läkemedel kan påverka levern).

HUR KAN MAN UNDVIKA STÖRNINGAR I LEVERNS FUNKTION UNDER BEHANDLINGEN?

► Gå på regelbundna blodprovskontroller

• Varför?

Läkaren har troligen låtit kontrollera att din lever fungerar som den ska redan **innan din läkemedelsbehandling** inleddes. Med hjälp av de blodprov som tas kan läkaren utvärdera **hur din lever fungerar**, och se om agomelatinbehandling är lämpligt för dig.

Halterna av leverenzymmer i blodet kan öka i samband med agomelatinbehandling. Leverenzymhalterna talar om hur väl din lever fungerar, och det är nödvändigt att följa upp dessa värden under din behandling.

• När?

Blodprov

	Innan behandlingen inleds och i samband med dosökning	Efter cirka 3 veckor	Efter cirka 6 veckor	Efter cirka 3 månader	Efter cirka 6 månader
Blodprov	✓	✓	✓	✓	✓

Om läkaren ökar din dos till 50 mg ska blodproven utföras på nytt.

Kom ihåg att ta med dig sidan med **PÅMINNELSE OM BLODPROV** (se nästa sida) till läkarmottagningen.

Tala omedelbart om för läkaren om du får höra att dina leverenzymvärden ökat medan behandlingen pågår.

► Var uppmärksam på symtom som kan tyda på störningar i leverns funktion

Om du observerar något av följande symtom, kan det betyda att din lever inte fungerar som den ska:

- gulskiftande hud eller ögonvitor
- mörk urin
- ljus avföring
- smärta i övre, högra delen av buken
- onormal trötthet (speciellt i samband med andra symtom som anges ovan)

⇒ Uppsök omedelbart läkare. Läkaren kan uppmana dig att avbryta agomelatinbehandlingen.

Påminnelse om blodprov

► Kom ihåg

Det är viktigt att lämna regelbundna blodprov under agomelatinbehandlingen.

Det blir lättare att komma ihåg tidpunkterna för blodprovstagningarna då de antecknas i följande tabell.

Agomelatin 25 mg	Datum
Datum då behandlingen påbörjades:	
Blodprov för kontroll av leverenzymhalterna	
Datum för det första blodprovet (innan behandlingen påbörjas)	
Datum för det andra blodprovet (efter cirka 3 veckor)	
Datum för det tredje blodprovet (efter cirka 6 veckor)	
Datum för det fjärde blodprovet (efter cirka 3 månader)	
Datum för det femte blodprovet (efter cirka 6 månader)	

Läkaren kan dessutom ordinera fler blodprovstagningar om nödvändigt.

Eventuell dosökning till 50 mg	Datum
Datum för dosökning:	
Blodprov för kontroll av leverenzymhalterna	
Blodprov då doseringen med 50 mg agomelatin inleds	
Datum för det andra blodprovet <i>(efter cirka 3 veckor)</i>	
Datum för det tredje blodprovet <i>(efter cirka 6 veckor)</i>	
Datum för det fjärde blodprovet <i>(efter cirka 3 månader)</i>	
Datum för det femte blodprovet <i>(efter cirka 6 månader)</i>	

Läkaren kan dessutom ordinera fler blodprovstagningar om nödvändigt.

Kom ihåg att ta med dig denna patientguide till läkarmottagningen.
Se *bipacksedeln* för ytterligare information.

Om du misstänker att du har fått en biverkning av läkemedlet, tala med läkaren som ansvarar för din behandling. Tala även om för läkaren om du tar några andra läkemedel eller kosttillskott, eftersom interaktioner kan förekomma.

Du kan även själv rapportera biverkningar:

Webbplats för Servier Finland Oy:
www.servierfinland.fi

eller

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

Patientguide

AGOMELATIN

Les Laboratoires Servier och Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.

Rekommendationer för att undvika leverbiverkningar

Agomelatin kan bl.a. orsaka förändringar i leverns funktion som en av sina biverkningar.

I denna patientguide ges rekommendationer för hur man kan undvika leverbiverkningar samt instruktioner för hur man ska göra om sådana biverkningar skulle uppkomma under agomelatinbehandlingen.

Vänd dig till läkaren som ansvarar för din behandling om du behöver mer information.

Agomelatin är ett antidepressivt läkemedel som används för behandling av depression.

För att få bästa möjliga nytta av behandlingen ska du alltid följa de anvisningar läkaren gett dig gällande agomelatinbehandlingen (dosering, behandlingens längd, uppföljning under behandlingen, såsom besök på läkarmottagningen, blodprov).