

Till patienter

Bär alltid med dig detta kort för att kunna informera sjukvårdspersonal att du är under behandling med ipilimumab (YERVOY®).

Om du upplever några tecken eller symtom, kontakta din läkare omedelbart.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

TARMAR OCH MAGE

- diarré (vattnig, mjuk eller lös avföring), blodig eller mörkfärgad avföring
- fler tarmtömningar än vanligt
- smärta eller ömhet i mage eller buk, illamående, kräkningar

ÖGON

- rodnad i ögat
- smärta i ögat
- synproblem eller dimsyn

LEVER

- gulfärgade ögon eller hud (gulsot)
- smärta på höger sida av magtrakten
- mörk urin

NERVER

- muskelsvaghet
- domningar eller stickningar i ben, armar eller ansikte
- yrsel, medvetlöshet eller svårigheter att vakna

HUD

- hudutslag med eller utan klåda, torr hud
- blåsor och/eller hudfjällning, munsår
- svullnad i ansiktet eller lymfkörtlarna

ÖVRIGT

- feber, huvudvärk, trötthet
- blödningar
- beteendeförändringar (till exempel minskad sexlust, irritation eller glömska)
- vätskebrist, lågt blodtryck, chock

⚠ VIKTIGT

- Berätta för din läkare om dina tidigare medicinska tillstånd.
- Tidig hantering av biverkningar minskar risken för att behandlingen med ipilimumab måste stoppas tillfälligt eller permanent.
- Tecken och symtom som tycks vara milda kan snabbt förvärras om de inte behandlas.
- Försök **inte** att behandla dessa symtom på egen hand.
- Tecken och symtom kan ibland uppträda sent, det vill säga veckor eller månader efter sista dos.

För mer information, se YERVOY® bipacksedel www.ema.europa.eu eller ring Bristol Myers Squibb Medicinsk Information på 09-25121244.

Kontaktuppgifter till min läkare

(läkare som förskrivit ipilimumab)

Läkarens namn:

Telefonnummer, kontorstid:

Telefonnummer utanför kontorstid:

Mina kontaktuppgifter

Patientens namn:

Patientens telefonnummer:

Kontaktinformation vid en nödsituation (namn och telefonnummer):

VIKTIG information till sjukvårdspersonal

- Denna patient behandlas med **ipilimumab (YERVOY®)** monoterapi.
- Immunrelaterade biverkningar kan uppträda när som helst under behandlingen eller månader efter avslutad behandling.
- Tidig diagnos och lämplig behandling är avgörande för att minimera livshotande komplikationer.
- Att konsultera en specialist inom onkologi eller annan medicinsk specialist kan vara till hjälp vid hanteringen av organspecifika immunrelaterade biverkningar.
- För mer information till sjukvårdspersonal, se YERVOY® produktresumé www.ema.europa.eu eller ring Bristol Myers Squibb Medicinsk Information på 09-25121244.

Läkare som förskriver ipilimumab till patienten ska fylla i sektionen "Kontaktuppgifter till min läkare" i detta Patientkort.

Patientkort

(ipilimumab)

YERVOY®

Misstänkta biverkningar skall rapporteras till:

Fimea: www.fimea.fi eller
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret, PB 55, 00034 FIMEA eller

Bristol Myers Squibb
Medicinsk Information: på telefonnummer 09 25121244 eller
medinfo.finland@bms.com.