

YERVOY® (ipilimumab)

Patientguide

- ▶ Denna YERVOY® patientguide och patientkortet är till för dig som ordinerats ipilimumab (YERVOY®) ensamt.
- ▶ Använd patientkortet för OPDIVO® om du har ordinerats ipilimumab i kombination med nivolumab (YERVOY® + OPDIVO®).



Introduktion

- Den här guiden ger dig information om behandling med ipilimumab och beskriver eventuella tecken och symtom på biverkningar som du kan få.
- Den innehåller också viktiga råd om vad du ska göra om du får tecken och symtom för att säkerställa att de inte förvärras och att du får behandling så snabbt och effektivt som möjligt.
- Ipilimumab kan orsaka allvarliga biverkningar i olika delar av kroppen som behöver behandlas omedelbart oberoende av svårighetsgrad för att undvika att de blir värre.
- **Denna guide inkluderar ett patientkort.** Bär alltid med dig patientkortet och visa det för all sjukvårdspersonal du träffar (till exempel om du är ute och reser eller om din vanliga läkare inte är tillgänglig).
- För mer information, se YERVOY® bipacksedel www.ema.europa.

Vad du ska kontrollera med din läkare före behandlingen



Innan du inleder behandlingen ska du informera din läkare om eventuell tidigare behandling du fått och eventuella sjukdomar du har eller har haft.

FÖRE BEHANDLINGEN KONTROLLERAR DIN LÄKARE:

- om du tar kortikosteroider eller annan behandling som påverkar immunsystemet
- om du tar några läkemedel som hindrar blodet från att levera sig (antikoagulerande medel)
- din leverfunktion
- din sköldkörtelfunktion
- om du har en autoimmun sjukdom (ett tillstånd där kroppen angriper sina egna celler)
- om du har eller har haft en kronisk virusinfektion i levern, inklusive:
 - hepatit B (HBV)
 - hepatit C (HCV)
- om du har en infektion med humant immunbristvirus (HIV) eller förvärvat immunbristsyndrom (AIDS)
- om du är gravid, ammar eller planerar att bli gravid
- ditt allmäntillstånd för att kunna avgöra om du är lämplig för behandlingen.

Behandlingens vanligaste biverkningar

Ipilimumab aktiverar ditt immunsystem att bekämpa cancerceller. Det finns en risk att ditt aktiverade immunsystem kan skada friska celler i kroppen, vilket kan orsaka biverkningar som kan vara allvarliga eller livshotande. Tecken och symtom på biverkningar kan uppträda när som helst under behandlingen eller månader efter avslutad behandling.

VAD DU SKA GÖRA OM DU MISSTÄNKER EN BIVERKNING:

- Ring din läkare **omedelbart** om du utvecklar några tecken eller symtom, eller om symtomen håller i sig eller blir värre. Tecken och symtom som tycks vara milda kan snabbt förvärras om de inte behandlas.
- Behandla **inte** tecken och symtom själv.
- Var **inte** generad och oroa dig inte för att störa din läkare.

Observera:

- Följande tecken och symtom är **inte** alla eventuella tecken och symtom på biverkningar av behandling med ipilimumab.
- Vissa tecken och/eller symtom som uppstår i en del av kroppen kan vara relaterade till en biverkning i en annan del av kroppen (till exempel kan gul hud utgöra ett leverproblem).

Tidig hantering av biverkningar minskar risken för att behandlingen med ipilimumab måste stoppas tillfälligt eller permanent, och möjliggör istället att du kan få ut maximal effekt av behandlingen.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

TARMAR OCH MAGE

- diarré (vattnig, mjuk eller lös avföring), blodig eller mörkfärgad avföring
- fler tarmtömningar än vanligt
- smärta eller ömhet i mage eller buk, illamående, kräkningar

ÖGON

- rodnad i ögat
- smärta i ögat
- synproblem eller dimsyn

LEVER

- guldfärgade ögon eller hud (gulsot)
- smärta på höger sida av magtrakten
- mörk urin

NERVER

- muskelsvaghet
- domningar eller stickningar i ben, armar eller ansikte
- yrsel, medvetslöshet eller svårigheter att vakna

HUD

- hudutslag med eller utan klåda, torr hud
- blåsor och/eller hudfjällning, munsår
- svullnad i ansiktet eller lymfkörtlarna

ÖVRIGT

- eber, huvudvärk, trötthet
- blödningar
- beteendeförändringar (till exempel minskad sexlust, irritation eller glömska)
- vätskebrist, lågt blodtryck, chock

Andra viktiga biverkningar:

SVÅRA INFUSIONSREAKTIONER

- Reaktionen på infusion av ipilimumab i blodomloppet kan förekomma, vanligen under eller inom 24 timmar efter infusionen.
- Tala genast om för din läkare eller sjuksköterska om du får dessa symtom under en infusion av ipilimumab: frossa eller skakningar, klåda eller utslag, rodnad, andningssvårigheter, yrsel, feber och känsla av svimfärdighet.

Patientkort

- Bär alltid med dig patientkortet och visa det för all sjukvårdspersonal du träffar (till exempel om du är ute och reser eller om din vanliga läkare inte är tillgänglig).
- Patientkortet påminner dig om viktiga symptom som omedelbart måste rapporteras till läkare/sjuksköterska. Det innehåller också kontaktuppgifter till din behandlande läkare och kommer göra övrig sjukvårdspersonal medvetna om att du behandlas med ipilimumab.
- Läkare som förskriver ipilimumab till dig ska fylla i sektionen "Kontaktuppgifter till min läkare" i patientkortet och nedan.



LÄGG IN
PATIENTKORT
HÄR

KONTAKTUPPGIFTER TILL MIN LÄKARE (läkare som förskrivit ipilimumab)

Läkarens namn:

Telefonnummer, kontorstid:

Telefonnummer utanför kontorstid:

Misstänkta biverkningar skall rapporteras till:

Fimea: www.fimea.fi eller Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret, PB 55, 00034 FIMEA eller **Bristol Myers Squibb Medicinsk Information:** på telefonnummer 09 25121244 eller medinfo.finland@bms.com.

För mer information, se YERVOY® bipacksedel www.ema.europa.eu eller ring Bristol Myers Squibb Medicinsk Information på 09-25121244.



Opdivo® and Yervoy® and the related logos are trademarks of Bristol Myers Squibb Company.
©2020 Bristol Myers Squibb Company. All rights reserved.