

YERVOY®

(ipilimumabi)

Potilaskortti

Tämä potilaskortti on tarkoitettu ipilimumabia yksilääkehoitona (monoterapia) saaville potilaille.

Potilaille

Pidä tämä kortti aina mukanasasi ja näytä se kaikille hoitoosi osallistuville terveydenhuollon ammattilaisille kertoaksesi, että saat YERVOY-valmistetta (ipilimumabi) yksilääkehoitona.



Jos havaitset mitä tahansa merkkejä tai oireita, ilmoita niistä **välittömästi** hoitavalle lääkärillesi.

Mahdolliset haittavaikutukset



Maha-suolikanava

Ripuli (vetinen, löysä tai pehmeä uloste), verinen tai tumma uloste, lisääntynyt ulostamisen tarve, mahan tai vatsan alueen kipu tai arkuus, pahoinvointi tai oksentelu



Silmät

Silmän punoitus, silmäkipu, näköhäiriöt tai näön sumeneminen



Hormoni-rauhaset

Sydämen tiheälyöntisyys, lisääntynyt hikoilu, painon muutokset, vilustumisen tunne, hiustenlähtö, ummetus, äänen madaltuminen, kuume, väsymys, päänsärky, huimaus tai pyörtyminen, normaalia suurempi nälän tai janon tunne, tarve virtsata useammin, käyttäytymismuutokset (kuten sukupuolivietin heikkeneminen, ärtyisyys tai unohtelu)



Maksa

Silmien tai ihon kellertuminen (ikterus), kipu vatsan oikealla puolella, tumma virtsa, verenvuoto



Keuhkot

Hengenahdistus, yskä, rintakipu



Hermot

Lihasjeikkous, jalkojen, käsien tai kasvojen tunnottomuus tai kihelmöinti, huimaus, tajunnanmenetys tai heräämisvaikeus



Iho

Ihottuma tai kutiseva ihottuma, kuiva iho, rakkulat ja/tai ihon kesiminen, suun haavaumat, kasvojen tai imusolmukkeiden turpoaminen

Muita mahdollisia haittavaikutuksia:

Vaikeat infuusioreaktiot:

- Infuusioreaktioita saattaa esiintyä, kun annetaan ipilimumabia tiputuksena (infuusiona) laskimoon. Yleisimmin infuusioreaktio voi esiintyä infuusion aikana tai sitä seuraavan 24 tunnin aikana.
- Kerro lääkärillesi tai hoitajallesi **välittömästi**, jos sinulla ilmenee ipilimumabi-infuusion aikana seuraavia oireita: vilunväristyksiä tai vapinaa, kutinaa tai ihottumaa, punoitusta, hengitysvaikeuksia, huimausta, kuumetta, pyörtymisen tunnetta.

Tärkeää

- Kerro lääkärillesi terveys- ja lääkityshistoriasi.
 - Välittömästi aloitettu haittavaikutusten hoito vähentää ipilimumabin keskeyttämisen tai lopettamisen mahdollista tarvetta.
 - Lievät merkit ja oireet voivat muuttua nopeasti vakavammiksi, jos ne jätetään hoitamatta.
 - **Älä** yritä hoitaa oireitasi itse.
-
- Merkit ja oireet voivat ilmaantua viiveellä, jopa viikkoja tai kuukausia viimeisen lääkannoksen jälkeen.

Lisätietoja saat YERVOY -pakkausselosteesta (www.ema.europa.eu) tai puhelimitse Bristol Myers Squibbin lääkeneuvonnasta 09-25121244.

Tärkeää tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

- Tätä potilasta hoidetaan ipilimumabi (YERVOY) monoterapialla.
 - Immuunivälitteisiä haittavaikutuksia voi ilmetä milloin tahansa hoidon aikana tai kuukausia hoidon lopettamisen jälkeen.
 - Haittavaikutusten varhainen diagnosointi ja asianmukainen hoito on tärkeää, jotta mahdolliset henkeä uhkaavat komplikaatiot voidaan minimoida.
 - Onkologin tai muun erikoislääkärin konsultointi voi olla hyödyllistä elinkohtaisten immuunivälitteisten haittavaikutusten hoidossa.
-
- Lisätietoja terveydenhuollon ammattilaisille YERVOY-valmisteyhteenvedosta www.ema.europa.eu tai puhelimitse Bristol Myers Squibbin lääkeneuvonnasta 09-25121244.

Potilaalle ipilimumabin määränneen lääkärin tulee täydentää yhteystietonsa tämän potilaskortin kohtaan “Hoitavan lääkäri yhteystiedot”.

Hoitavan lääkäri yhteystiedot (Yervoy-hoidon määrännyt lääkäri)
Lääkärin nimi: _____
Puhelinnumero: _____
Päivystysnumero: _____

Potilaan yhteystiedot
Potilaan nimi: _____
Potilaan puhelinnumero: _____
Yhteyshenkilö hätätilanteissa (nimi ja puhelinnumero): _____