

YERVOY®

(ipilimumab)

Patientkort

Detta patientkort är till för patienter som behandlas med ipilimumab som monoterapi.

Till patienter

Bär alltid det här kortet med dig för att informera sjukvårdspersonal om att du behandlas med YERVOY (ipilimumab) som monoterapi.



Om du får tecken eller symtom, tala **genast** om det för din läkare.

Eventuella biverkningar



Gastro-intestinala

Diarré (vattnig, lös eller mjuk avföring), blodig eller mörkfärgad avföring, fler tarmtömningar än vanligt, smärta eller ömhet i mage eller buk, illamående eller kräkningar



Ögon

Röda ögon, ögonsmärta, synproblem eller dimsyn



Hormon-körtlar

Ökad puls, ökad svettning, viktförändring, frossa, håravfall, förstoppning, mörkare röst, feber, trötthet, huvudvärk, yrsel eller svimning, överdriven hunger och/eller törst, behov av att kissa oftare, beteendeförändringar (såsom minskad sexlust, irritabilitet eller glömska)



Lever

Gulfärgade ögon eller hud (gulsot), smärta på höger sida i magtrakten, mörk urin, blödningar



Lungor

Andnöd, hosta, bröstsmärta



Nerver

Muskelsvaghet, domningar eller stickningar i ben, armar eller ansikte, yrsel, medvetslöshet eller svårigheter att vakna



Hud

Hudutslag med eller utan klåda, torr hud, blåsor och/eller flagande hud, munsår, svullnad i ansiktet eller lymfkörtlarna

Andra viktiga biverkningar:

Allvarliga infusionsreaktioner:

- Eventuella reaktioner i samband med infusionen av ipilimumab i blodbanan inträffar vanligen under infusionen eller inom 24 timmar.
- Tala **omedelbart** om för din läkare eller sjukskötare om du får något av följande symtom under infusionen av ipilimumab: frossa eller skakningar, klåda eller utslag, rodnad, andningssvårigheter, yrsel, feber, svimningskänsla.

Viktigt

- Berätta för din läkare om sjukdomar du har eller har haft.
- Tidig behandling av biverkningar minskar risken för att behandlingen med ipilimumab tillfälligt eller permanent måste avbrytas.
- Tecken och symtom som kan verka lindriga kan snabbt bli värre om de inte behandlas.
- Försök **inte** behandla dessa symtom själv.
- Tecken och symtom kan vara fördröjda och kan uppkomma veckor till månader efter din sista dos.

För mer information, se YERVOY-bipacksedel www.ema.europa.eu eller ring Bristol Myers Squibb Medicinsk Information på 09–25121244.

Viktig information för sjukvårdspersonal

- Denna patient behandlas med ipilimumab (YERVOY) monoterapi.
- Immunrelaterade biverkningar kan uppträda när som helst under behandlingen eller månader efter avslutad behandling.
- Tidig diagnos och lämplig behandling är avgörande för att minimera livshotande komplikationer.
- Konsultation av en onkolog eller övrig specialist kan vara till hjälp vid hantering av organspecifika immunrelaterade biverkningar.
- För mer information till sjukvårdspersonal, se YERVOY produktresumé www.ema.europa.eu eller ring Bristol Myers Squibb Medicinsk Information på 09–25121244

Läkare som förskriver ipilimumab till patienten ska fylla i avsnittet "Kontaktuppgifter till min läkare" i detta Patientkort.

Kontaktuppgifter till min läkare (läkare som förskrivit ipilimumab)

Läkarens namn: _____

Telefonnummer: _____

Jourtelefonnummer: _____

Patientens kontaktuppgifter

Patientens namn: _____

Patientens telefonnummer: _____

Kontaktinformation vid en nödsituation (namn och telefonnummer):
