

PATIENTKORT FÖR ZESSLY® (INFLIXIMAB)

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Patientens namn: _____

Läkarens namn: _____

Läkarens telefonnummer: _____

Det här patientkortet innehåller viktig säkerhetsinformation som du behöver vara medveten om innan och under din behandling med Zessly. Visa alltid det här kortet för alla läkare som är delaktiga i att behandla dig (oavsett vilken sjukdom det gäller). Läs igenom bipacksedeln till Zessly noggrant innan du börjar ta den här medicinen.

Datum för behandlingsstart med Zessly: __/__/__

Senaste behandlingar: _____

Det är viktigt att du och din läkare antecknar varunamnet och tillverknings-satsnumret på läkemedlet.

Be läkaren att anteckna typ och datum för senaste screening(ar) för tuberkulos (TBC) nedan:

Test: _____

Datum: __/__/__

Resultat: _____

Test: _____

Datum: __/__/__

Resultat: _____

Se till att du alltid har med dig en lista över alla andra läkemedel som du använder när du träffar sjukvårdspersonal.

Lista över allergier: _____

Lista över andra läkemedel: _____

Rapportering av biverkningar

Om du märker några biverkningar, kontakta läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i bipacksedeln. Du kan också rapportera biverkningarna direkt (se kontaktuppgifter nedan). Genom att rapportera biverkningarna kan du hjälpa till att få mer information om säkerheten för detta läkemedel.

Webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

Infektioner

Före behandling med Zessly

- Tala om för din läkare om du har en infektion, även en lindrig sådan.
- Det är mycket viktigt att du talar om för din läkare om du någonsin har haft tuberkulos eller om du har varit i nära kontakt med någon som har haft tuberkulos. Din läkare kommer att undersöka om du har tuberkulos. Be din läkare att notera typ och datum för senaste tuberkulosundersökning på kortet.
- Tala om för din läkare om du har hepatit B eller om du vet eller misstänker att du är bärare av hepatit B virus.

Under behandling med Zessly

- Tala omedelbart om för din läkare om du har tecken på en infektion. Sådana tecken omfattar feber, trötthetskänsla, (ihållande) hosta, andfåddhet, viktninskning, nattliga svettningar, diarré, sår, tandbesvär, sveda vid urinering eller influensaliknande symtom.

Graviditet, amning och vaccinationer:

Om du har fått Zessly under din graviditet eller om du ammar, är det viktigt att du informerar ditt barns läkare om detta innan ditt barn får något vaccin. Ditt barn ska inte få 'levande vacciner', såsom BCG (används för att förhindra tuberkulos) inom 12 månader efter födseln eller medan du ammar om inte annat rekommenderas av din läkare.

Ha alltid med dig detta kort i 4 månader efter din sista Zessly dos, eller i händelse av graviditet i 12 månader efter ditt barns födelse. Biverkningar kan uppträda långt efter sista dosen.