

## Zoledronic acid STADA/ Zolestad

### Potilaskortti

**Tämä potilaskortti sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, joihin sinun on tutustuttava ennen kuin saat tsoledronihappopistoksia syöpään liittyvien tilojen hoidossa. Tiedot on huomioitava myös hoidon aikana.**

Lääkärisi on suositellut, että sinua hoidetaan tsoledronihapolla luustomurtumien ehkäisemiseksi.

Haittavaikutusta, jota kutsutaan leuan osteonekroosiksi (leuan luuvauriot), on ilmoitettu potilailla, jotka saavat tsoledronihappoa pistoksina syöpään liittyvien tilojen hoidossa. Osteonekroosia voi ilmetä myös hoidon lopettamisen jälkeen.

Leuan osteonekroosin kehittymisen riskin pienentämiseksi on olemassa varotoimia, joita sinun tulee noudattaa:

#### **Ennen hoidon aloittamista:**

- Kysy lääkäriltäsi leuan osteonekroosista ennen hoidon aloittamista.
- Kysy lääkäriltäsi, suositellaanko sinulle käyntiä hammastarkastuksessa ennen tsoledronihappohoidon aloittamista.
- Kerro lääkärille/ hoitajallesi (terveydenhuoltohenkilöstölle), jos sinulla on ongelmia suun tai hampaiden kanssa.

Hammasteikkaus (esim. hampaan poisto), säännöllisen hammashoidon puute, iensairaus, tupakointi tai aiempi bisfosfonaattihoito (käytetään luustohäiriöiden hoitoon tai ennaltaehkäisyyn) voivat suurentaa leuan osteonekroosin kehittymisen riskiä.

#### **Hoidon aikana:**

- Sinun tulee säilyttää hyvä suuhygienia, pitää huolta että hammasproteesisi istuu kunnolla ja käydä säännöllisesti hammastarkastuksessa.
- Jos saat hammashoitoja tai sinun on määrä mennä hammasleikkaukseen (esim. hampaan poisto), kerro siitä lääkärille ja kerro hammaslääkärille, että sinua hoidetaan tsoledronihapolla.
- Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin ja hammaslääkärin, jos sinulla on mitä tahansa ongelmia suun tai hampaiden kanssa esim. hampaiden heiluminen, kipu tai turvotus, haavaumien parantumattomuus tai märkiminen, sillä ongelmat saattavat olla oire leuan osteonekroosiksi kutsusta tilasta.

Lue lisätietoja pakkausselosteesta.