



 Labeling Support eK Schwabacher Straße 512 D-90763 Fuerth Germany	<b>Product name</b> EDUMAT Zyprexa Relprevv Patient Card - swedish	<b>COLORS</b> CYAN  MAGENTA  YELLOW  BLACK 
	<b>Country</b> [FI]	
<b>CLS number / Date / Proof</b> 14713 / 2024-02-13 [11:43 AM] / MW / P1		
<b>Artwork-Dimensions</b> 234 x 300 mm		



Olanzapin pulver och vätska, depotsuspension

**INDIKATION**  
 Underhållsbehandling av vuxna patienter med schizofreni som stabiliserats under akut behandling med oralt olanzapin.



Liksom alla läkemedel kan också ZYPADHERA orsaka biverkningar, men alla användare får inte biverkningar nödvändigtvis.

Vanliga biverkningar: uppträder hos 1 till 10 användare av 100

- ZYPADHERA kan ibland komma in i blodomloppet alltför snabbt och detta kan leda till följande biverkningar efter injektionen. Ibland kan symptomen leda till medvetslöshet.
  - Extrem sömnhighet, yrsel, förvirring, desorientering, svårighet att tala, svårighet att gå, muskelstelhet eller skakningar, svaghet, irritabilitet, aggression, ångest, ökat blodtryck eller krampor

- Sömnhighet
- Smärta på injektionsstället.

Biverkningarna nedan har observerats när olanzapin har intagits oralt (genom munnen), men de kan även uppkomma efter ZYPADHERA-injektion.

Mycket vanliga biverkningar: uppträder hos 1 användare av 10

- Viktökning
- Sömnhighet
- Ökad prolaktinhalt i blodet
- I början av behandlingen kan vissa personer känna yrsel eller svimma (med långsam hjärtfrekvens) särskilt när de reser sig från liggande eller sittande ställning. Detta försvinner ofta av sig själv. Om så ej är fallet, kontakta din läkare.

Vanliga biverkningar: uppträder hos 1 till 10 användare av 100

- Förändringar i nivåer av blodkroppar, blodfetter och i början av behandlingen, tillfälligt ökat antal leverenzymmer
- Ökade sockernivåer i blodet och urinen
- Förhöjd nivå av urinsyra och kreatinin fosfokinas i blodet
- Ökad aptit
- Yrsel
- Rastlöshet
- Darrningar
- Rörelsesvårigheter (dyskinesi)
- Förstoppning
- Muntorrhet
- Utslag
- Kraftlöshet
- Extrem trötthet
- Vätskeansamling som leder till svullnader i händer, vristor eller fötter

- Feber
- Ledsmärta
- Sexuella problem såsom minskad sexualdrift hos män och kvinnor eller erektionsproblem hos män.

Om några biverkningar blir värre eller om Du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare. Närmare information finns i bipacksedeln.

## VIKTIG INFORMATION FÖR PATIENTER

ZYPADHERA kan ibland gå in i blodet alltför snabbt. Om detta inträffar, kan Du få följande symptom efter injektionen: extrem sömnhighet, yrsel, förvirring, desorientering, svårighet att tala, svårighet att gå, muskelstelhet eller skakningar, svaghet, irritabilitet, aggression, ångest, ökat blodtryck eller krampor och kan leda till medvetslöshet.

Därför:

- Kommer Du att observeras på vårdenheten av läkare eller skötare, med avseende på uppkomst av ovanstående symptom i minst 3 timmar.
- Läkaren eller skötaren kontrollerar att Du inte har a.o. symptom innan du lämnar lokalen.
- Det är inte sannolikt att Du får sådana symptom efter mer än 3 timmar efter injektionen. Om detta inträffar, ska Du genast ta kontakt med Din läkare eller sjuksköterska.
- På grund av denna risk ska Du inte köra bil eller hantera maskiner under återstoden av dagen efter injektionen.

Tala om för Din läkare eller sjuksköterska då Du är på vårdenheten om

- Du är väldigt sömning
- Du känner Dig yr
- Du känner Dig förvirrad
- Du är irriterad eller aggressiv
- Du är ångestfylld
- Du har svårt att tala eller gå
- Du känner Dig svag
- Du känner att Dina muskler är stela eller att de darrar.

Läkaren eller skötaren ska kontrollera att Du är alert och symptomfri, då Du lämnar vårdenheten. De ska också förklara för Dig hur Du ska göra, om Du får besvär sedan Du lämnat vårdenheten.

Ytterligare information om ZYPADHERA ingår i bipacksedeln som finns i förpackningen.

## INJEKTIONSBEHANDLING MED ZYPADHERA

Namn \_\_\_\_\_

Adress \_\_\_\_\_

Telefonnummer \_\_\_\_\_

Kontaktinformation i nödfall \_\_\_\_\_

