

Jos oksennat 30 minuutin kuluessa mifepristonin ottamisesta, sinun on otettava uusi tabletti.

Jos sinulla ei ole lainkaan verenvuotoa 24-48 tunnin kuluttua misoprostolin ottamisesta tai sitä on vain vähän, ota yhteys lääkäriin, sairaanhoitajaan tai kättilöön. Tilanteeseen ei liity akuuttia vaaraa, mutta se voi olla merkki siitä, ettei lääke ole toiminut.

Mistä tiedän, onko Medabon® toiminut?

Käy lääkärin, sairaanhoitajan tai kättilön vastaanotolla uudelleen 2–3 viikkoa tablettien ottamisen jälkeen. Silloin voidaan vahvistaa, että raskaus on keskeytynyt.

Harvinaisissa tapauksissa lääkehoito voi epäonnistua ja raskaus jatkua Medabonin® ottamisen jälkeenkin. Näin tapahtuu alle prosentilla naisista (harvemmalla kuin yhdellä sadasta). Tällöin on tehtävä muita toimenpiteitä raskauden keskeyttämiseksi.

Milloin voin harrastaa taas seksiä?

Ei ole mitään tiettyä määräaikaa, jonka kuluttua seksiä voi taas harrastaa. Jos haluat välttää raskaaksi tulemistä, sinun on otettava välittömästi käyttöön tehokas ehkäisymenetelmä (ks. alla).

Milloin voin tulla uudelleen raskaaksi?

Voit tulla uudelleen raskaaksi jo pian Medabonin® ottamisen jälkeen. Puhu hoitajasi kanssa ehkäisymenetelmistä, jos et halua tulla raskaaksi. Useimpien ehkäisymenetelmien käytön voi aloittaa samanaikaisesti Medabonin® ottamisen kanssa.

Kuinka monta kertaa minun on käytävä vastaanotolla/klinikalla?

Kaksi tai kolme kertaa. Ensimmäisellä käynnillä otat mifepristonin, ja sinun on käytävä vastaanotolla/klinikalla noin 2–3 viikkoa myöhemmin sen varmistamiseksi, että hoito on onnistunut. Puhu hoitajaksi kanssa siitä, haluatko ottaa misoprostolin kotona vai vastaanotolla/klinikalla.

Täytä tämä kaavio lääkärin, sairaanhoitajan tai kättilön kanssa.

Otin ensimmäisen tabletin _____
(1. päivä)

Otin neljä pientä tablettia _____
(2. tai 3. päivä)

Seurantakäyntini on _____
(14–21 päivän kuluttua)

Yhteystiedot hätätilanteita varten:

tammikuu 2014



Polarisavenue 87
2132 JH Hoofddorp
Alankomaat

Puh. +31 (0)23 56 85501
www.sunpharma-europe.nl
www.sunpharma.com




Medabon®
lääkkeellinen raskaudenkeskeytys

Tärkeää tietoa

Mikä Medabon® on?

Medabon® sisältää samassa pakkauksessa kahdenlaisia tabletteja – mifepristonia ja misoprostolia. Tabletteja käytetään varhaisessa vaiheessa olevan raskauden keskeyttämiseen turvallisesti ja tehokkaasti. Tabletit aiheuttavat verenvuotoa ja supistuksia, jotka voivat muistuttaa voimakasta kuukautisvuotoa tai keskenmenoa.



Sopiiko Medabon® minulle?

Medabon® sopii sinulle, jos olet enintään yhdeksättä viikkoa raskaana. Se merkitsee, että sinulla on ollut edelliset kuukautiset yhdeksän viime viikon aikana eli edellisten kuukautisten alkamisesta on enintään 63 päivää. Jos et muista tarkasti, minä päivänä edelliset kuukautisesi alkoivat, lääkäri, sairaanhoitaja tai kätilö voi auttaa sinua määrittämään, miten pitkään olet ollut raskaana.

Joillekin naisille Medabon® ei sovi. Ennen Medabonin® käytön aloittamista kerro hoitajallesi, jos sinulla on tai on ollut terveysongelmia, etenkin verisairauksia tai hemostaattisia häiriöitä. Kerro myös mahdollisesta lääkityksestäsi. Kerro lääkärille, sairaanhoitajalle tai kätilölle, jos sinulla on ehkäisykierukka.

Jos imetät, imettäminen on lopetettava hoidon alettua.

Miten Medabonia® käytetään?

Ensimmäisenä päivänä nielet mifepristoni-nimisen tabletin.



36–48 tuntia myöhemmin otat misoprostolitabletit emättimen kautta:



- Käy makuulle ja työnnä neljä misoprostoli-emätintablettia emättimeesi. Työnnä tabletit yksi kerrallaan emättimeesi niin syväälle kuin mahdollista, jotta ne eivät luiskahda ulos. Pysy makuulla vielä noin puoli tuntia.

Mitä tablettien ottamisen jälkeen tapahtuu?

Joillakin naisilla emättimestä alkaa vuotoa verta ensimmäisen tabletin (mifepristonin) ottamisen jälkeen. Se on täysin normaalia. Yleensä verenvuoto emättimestä ja supistukset alkavat hieman sen jälkeen, kun emätintabletit (misoprostoli) on otettu.

Verenvuoto ja supistukset ovat usein voimakkaampia kuin voimakkaiden kuukautisten aikana. Veri voi olla paksua ja paakkuista. Verenvuoto on tavallisesti voimakkaimmillaan 4–6 tuntia misoprostolin ottamisen jälkeen, mutta vuotoa ja tiputtelua voi esiintyä vielä 2–3 viikon kuluttua.

Myös supistukset ovat voimakkaimmillaan pian misoprostolin ottamisen jälkeen. Voit ottaa särkylääkettä, kuten ibuprofeenia, tai pitää kuumavesipulloa tai lämpötyynyä alavatsaa vasten.

Seuraavat oireet ovat Medabonin® tavallisia haittavaikutuksia misoprostolin ottamispäivänä:

- pahoinvointi
- kuume
- päänsärky
- oksentelu
- vilunväristykset
- ripuli

Milloin on hakeuduttava lääkäriin?

Jos sinulla on seuraavia oireita tai muita oireita, jotka vaivaavat sinua, ota yhteyttä lääkäriin, sairaanhoitajaan tai kätilöön. Jos menet ensiapuun toisen lääkärin hoitoon, ota tämä esite mukaasi.

- Hakeudu hoitoon, jos sinulla on hyvin voimakasta verenvuotoa, jonka takia sinun on vaihdettava terveysside useammin kuin kaksi kertaa tunnissa yli kahden tunnin aikana, tai jos sinua huimaa, pyörryttää tai heikottaa.
- Hakeudu hoitoon, jos sinulla on kuumetta 38 °C tai enemmän, ja kuume jatkuu pidempään kuin yhden päivän misoprostoli-emätintablettien ottamisen jälkeen.
- Hakeudu hoitoon, jos oksentelet jatkuvasti tai sinulla on ripuli pidempään kuin yhden päivän misoprostoli-emätintablettien ottamisen jälkeen.
- Hakeudu hoitoon, jos sinulla on kova, jatkuva tai koveneva vatsakipu, johon särkylääke, lepo tai kuumavesipullo ei tehoa.