

## POTILAAN HÄLYTYSKORTTI – AKUUTTI MYELOOINEN LEUKEMIA

**Tibsovo 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen ivosidenibi**

**Tietoa potilaalle, joka saa hoitoa akuuttiin myelooiseen leukemiaan**

**Tämä potilastietokortti sisältää tärkeitä tietoja Tibsovo-valmisteesta sinulle ja terveydenhuollon ammattilaisille.**

- Pidä tämä kortti aina mukanas.
- Kerro kaikille lääkäreille, apteekkihenkilökunnalle ja sairaanhoitajille, että käytät Tibsovo-valmistetta.
- Jos saat mitään alla luetelluista oireista, ota välittömästi yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen ja näytä hänelle potilaan hälytyskortti.
- Varmista, että käytössäsi on tämän kortin viimeisin versio. Se sisältyy viimeisimpään tablettipakkaukseen.

### **Tietoa hoidostasi**

- Tibsovo-valmistetta käytetään akuuttia myelooista leukemiaa (AML) sairastavien aikuisten hoitoon, ja sitä annetaan yhdistelmänä toisen, ”atsasitidiini” -nimisen syöpälääkkeen kanssa. Tibsovo-valmistetta käytetään vain potilaille, joiden AML liittyy muutokseen (mutaatioon) IDH1-proteiinissa.
- Tibsovo voi aiheuttaa **vakavia haittavaikutuksia**, mukaan lukien vakavan tilan nimeltä **erilaistumisoireyhtymä**.
- Erilaistumisoireyhtymä voi olla hoitamattomana hengenvaarallinen.
- Erilaistumisoireyhtymä ilmeni AML-potilailla enintään 46 vuorokauden kuluttua hoidon aloittamisesta.

**Käänny heti lääkärin puoleen**, jos sinulla on jokin seuraavista erilaistumisoireyhtymän oireista:

- kuume
- yskä
- hengitysvaikeudet
- ihottuma
- vähentynyt virtsaaminen
- heitehuimaus tai pyörrytys
- nopea painon nousu
- käsivarsien tai säärien turvotus.

**Katso lisätietoja Tibsovo-valmisteen pakkausselosteesta.**

### **Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille**

- Tibsovo-valmisteella hoidetuilla potilailla on ilmennyt erilaistumisoireyhtymää, joka voi olla hoitamattomana hengenvaarallinen tai kuolemaan johtava.
- Erilaistumisoireyhtymä ilmeni AML-potilailla enintään 46 vuorokauden kuluttua hoidon aloittamisesta.
- Erilaistumisoireyhtymään liittyy myelooisten solujen nopea proliferaatio ja erilaistuminen.

Oireita ovat muun muassa:

ei-infektioosi leukosytoosi, perifeerinen ödeema, kuume, dyspnea, pleuraeffuusio, hypotensio, hypoksia, keuhkoödeema, pneumoniitti, perikardiaalinen effuusio, ihottuma, nesteylimäärä, tuumorilyysioireyhtymä ja kohonnut kreatiniinipitoisuus.

- Jos erilaistumisoireyhtymää epäillään, anna systeemisiä kortikosteroideja ja aloita hemodynaaminen seuranta, kunnes oireet poistuvat, mutta jatka sitä kuitenkin vähintään 3 vuorokauden ajan.

**Katso lisätietoja Tibsovo-valmisteen valmisteyhteenvedosta.**

**Täytä tämä osio**

Potilaan nimi: \_\_\_\_\_

Syntymäaika: \_\_\_\_\_

Tibsovo-valmisteen aloituspäivä ja annos:

\_\_\_\_\_

Lääkemääräyksen kirjoittajan / sairaalan yhteystiedot hätätilanteita varten:

\_\_\_\_\_