



ihmisen normaali immunoglobuliini (10 %)
rekombinantti ihmisen hyaluronidaasi

HyQvia®-hoidon infuusio suoraan injektiopulloista elektronisella lääkeannostelijalla (peristalttisella infuusiopumpulla)

Opas terveydenhuollon ammattilaisille, potilaille ja heitä hoitaville henkilöille
Lisätietoja sinua hoitavilta terveydenhuollon ammattilaisilta koulutuksen jälkeen

Käyttöaiheet

Korvaushoito aikuisille, lapsille ja nuorille (0–18-vuotiaille) seuraaviin käyttöaiheisiin:

- Primaarinen immuunivajausoireyhtymä (PID) ja heikentynyt vasta-ainetuotanto.
- Sekundaariset immuunipuutokset (SID) potilailla, joilla on vaikeita tai toistuvia infektoita, joille annettu mikrobilääkehoito ei tehoa ja joilla on joko todennettu spesifin vasta-aineen toimimattomuus (proven specific antibody failure, PSAF)* tai seerumin IgG-pitoisuus < 4 g/l.

Immunomodulatorinen hoito aikuisille, lapsille ja nuorille (0–18-vuotiaille):

- Kroonista tulehduksellista demyelinoivaa polyneuropatiaa (CIDP) sairastavien potilaiden ylläpitohoitoon, kun tila on vakautettu IVIg-hoidolla.

*PSAF = IgG-vasta-ainetitteri pneumokokkipolysakkaridi- ja polypeptidiantigeenirokotteita vastaan ei vähintään kaksinkertaistu

Tämä opas on tarkoitettu käytettäväksi, kun potilaalle on määrätty **HyQvia-valmistetta**



Tekijänoikeudet © 2024 Takeda Pharmaceutical Company Limited.
Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

FI/HYQ/015/02.2024 - 2.0 – Fimean hyväksymispäivämäärä: 18.10.2024

Siirry osoitteeseen
<https://axian.link/hyq-hcp-fin>
nähdäksesi digitaalisen oppaan



Kuinka käyttää tätä opasta

Tämä opas on tehty auttamaan sinua kouluttamaan potilaita ja heitä hoitavia henkilöitä antamaan HyQvia-hoitoa itsenäisesti. Ennen kuin käytät tätä opasta, huomioi seuraavat asiat:

- Aloita tutustumalla tämän oppaan ja potilasoppaan sisältöön ja toimintoihin ennen kuin annat potilaille ohjeita.
- Ajattele tätä opasta vuoropuhelun apuvälineenä, ei käsikirjoituksena. Käytä opasta ohjeistamisen apuna.
- Älä ohita osioita tai vaiheita. Käytä annettuja lisäkohtia ("Korostettavat kohdat") ehdotuksina ohjeiden täydentämiseksi.

Ottamalla tämän oppaan olennaiseksi osaksi koulutusta voit auttaa tarjoamaan potilaillesi positiivisen HyQvia-infuusiokokemuksen.

Huomioita potilaista

Tärkeä osa koulutusta on arvioida potilaiden HyQvia-hoidon tuntemusta ja sitä, kuinka mukavaksi he tuntevat olonsa infuusioprosessin suhteen. Suurin osa kouluttamistasi potilaista tulee jostain alla olevista ryhmistä.

Jos koulutat tällaista potilasta...	...on hyvä pitää mielessä nämä kohdat.
Siirtyminen suonensisäisestä IG-hoidosta (IVIG)	• Ihonalainen annostelu voi olla vierasta • Saattaa pelätä infuusion antamista itse (esimerkiksi valmisteiden valmistelu ja neulan asettaminen) • Ei välttämättä ole tottunut aseptiseen tekniikkaan • Lääkeannostelijan käyttö voi olla vierasta
Siirtyminen ihonalaisesta IG-hoidosta (SCIG)	• Saattaa olla tottunut pienempiin infuusiomääriin paikkaa kohti • HyQvia-valmisteen nopeampi infuusionopeus voi olla vierasta • Lääkeannostelijat, jotka täyttävät kriteerit HyQvia-valmisteen kanssa käytettäväksi, voivat olla vieraita (mukaan lukien elektroniset lääkeannostelijat)

Sinuun päin oleva puoli



Potilaaseen päin oleva puoli



Kun olet tutustunut tämän oppaan yleiskatsaukseen ja sen toimintaan, olet valmis käyttämään loppuja sivuja potilaiden ja heitä hoitavien henkilöiden kouluttamiseen.

5 vaihetta HyQvia-hoidon infuusiossa

Yleiskatsaus infuusiosta

Olet saanut tämän vaiheittaisen oppaan, koska terveydenhuollon ammattilainen on määrännyt sinulle tai hoitamallesi henkilölle **HyQvia**-hoidon. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua infusoimaan **HyQvia**-valmistetta elektronisella lääkeannostelijalla. Käytä tätä opasta, kun **HyQvia** annostellaan suoraan injektiopullosta. Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita **HyQvia**-infuusion antamisesta, keskustele niistä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Infusoi HyQvia-valmistetta vasta sen jälkeen, kun terveydenhuollon ammattilainen on kouluttanut sinut tai sinua hoitavan henkilön ja lukenut pakkausselosteen tiedot.



HY = rekombinantti ihmisen hyaluronidaasi

IG = ihmisen normaali immunoglobuliini (10 %)

1. Valmistaudu

- Tarkista injektiopullot
- Kerää tarvikkeet
- Pese kädet

2. Valmistele HY

- Siirrä **HY** ruiskuun (ruiskuihin)
- Kiinnitä neulasarjaan
- Täytä neulasarja

3. Valmistele IG

- Siirrä **IG** infuusioletkuun

4. Infusoi HyQvia

- Kiinnitä ja varmista neula
- Infusoi **HY** manuaalisesti (**ensin**)
- Infusoi **IG** lääkeannostelijalla (**toiseksi**)

5. Viimeistele

- Poista neula
- Kirjaa infuusio

Infusoi **HyQvia** vasta, kun olet saanut koulutuksen terveydenhuollon ammattilaiselta ja olet lukenut **HyQvia**-valmisteen pakkausselosteen.

5 vaihetta HyQvia-hoidon infuusiossa

Opeta potilaillesi tai heitä hoitaville henkilöille alla olevat kohdat. Käsittele myös “Korostettavat kohdat”

5 vaihetta HyQvia-hoidon infuusiossa

Yleiskatsaus infuusiosta

Olet saanut tämän vaiheittaisen oppaan, koska terveydenhuollon ammattilainen on määrännyt sinulle tai hoitamallesi henkilölle **HyQvia**-hoidon. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua infusoimaan **HyQvia**-valmistetta elektronisella lääkeannostelijalla. Käytä tätä opasta, kun **HyQvia** annostellaan suoraan injektiopullosta. Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita **HyQvia**-infuusion antamisesta, keskustele niistä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Infusoi HyQvia-valmiste vasta sen jälkeen, kun terveydenhuollon ammattilainen on kouluttanut sinut tai sinua hoitavan henkilön ja lukenut pakkausselosteen tiedot.



HY = rekombinantti ihmisen hyaluronidaasi
IG = ihmisen normaali immunoglobuliini (10 %)

1.

Valmistaudu

- Tarkista injektiopullot
- Kerää tarvikkeet
- Pese kädet

2.

Valmistele HY

- Siirrä **HY** ruiskuun (ruiskuihin)
- Kiinnitä neulasarjaan
- Täytä neulasarja

3.

Valmistele IG

- Siirrä **IG** infusioletkuun

4.

Infusoi HyQvia

- Kiinnitä ja varmista neula
- Infusoi **HY** manuaalisesti (ensin)
- Infusoi **IG** lääkeannostelijalla (toiseksi)

5.

Viimeistele

- Poista neula
- Kirjaa infusio

Infusoi **HyQvia** vasta, kun olet saanut koulutuksen terveydenhuollon ammattilaiselta ja olet lukenut **HyQvia**-valmisteen pakkausselosteen.

Korostettavat kohdat

- Varmista, että potilaat ovat ottaneet HyQvia-valmisteen pois jääkaapista.** **HyQvia** tulee olla huoneenlämpöistä ennen sen infusointia (tämä voi kestää jopa 60 minuuttia). Älä käytä lämmityslaitteita, kuten mikroaaltouunia.
- Arvioi potilaiden tietämys HyQvia-hoidosta ja arvioi kuinka mukavaksi he tuntevat olonsa infuusioprosessin suhteen.**
- Korosta, että prosessissa on 5 vaihetta.** Kannusta potilaita oppimaan infuusioprosessi tarjotun koulutuksen avulla.
- Korosta, että HY infusoidaan ennen IG:a.** Selitä, että **HyQvia** on HY:n ja IG:n kahden injektiopullon yksikkö. **IG-infuusio tulee aloittaa heti HY- infuusion päätyttyä (10 minuutin kuluessa).** HY auttaa IG:a imeytymään enemmän kehoon. IG auttaa kehoa torjumaan infektioita.

5 vaihetta HyQvia-hoidon infuusiossa

Yleiskatsaus infuusiosta

Olet saanut tämän vaiheittaisen oppaan, koska terveydenhuollon ammattilainen on määrännyt sinulle tai hoitamallesi henkilölle **HyQvia**-hoidon. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua infusoimaan **HyQvia**-valmistetta elektronisella lääkeannostelijalla. Käytä tätä opasta, kun **HyQvia** annostellaan suoraan injektiopullosta. Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita **HyQvia**-infuusion antamisesta, keskustele niistä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Infusoi HyQvia-valmiste vasta sen jälkeen, kun terveydenhuollon ammattilainen on kouluttanut sinut tai sinua hoitavan henkilön ja lukenut pakkausselosteen tiedot.



HY = rekombinantti ihmisen hyaluronidaasi
IG = ihmisen normaali immunoglobuliini (10 %)

1.

Valmistaudu

- Tarkista injektiopullot
- Kerää tarvikkeet
- Pese kädet

2.

Valmistele HY

- Siirrä **HY** ruiskuun (ruiskuihin)
- Kiinnitä neulasarjaan
- Täytä neulasarja

3.

Valmistele IG

- Siirrä **IG** infusioletkuun

4.

Infusoi HyQvia

- Kiinnitä ja varmista neula
- Infusoi **HY** manuaalisesti (ensin)
- Infusoi **IG** lääkeannostelijalla (toiseksi)


5.

Viimeistele


- Poista neula
- Kirjaa infusio

Mitä tarvitset


Alla on tarvikkeet, joita tarvitset HyQvia-valmisteen infusointiin. Tarvikkeesi voivat näyttää hieman erilaisilta.




- **HyQvia** injektiopullo(t)




- Alkoholipyyhkeet, teippi ja puhdas, steriili laastari*




- 20 ml ruisku(t)[†]




- Tarvittaessa: Steriilit suojakorkit (yksi ruiskua kohti)




- Lääkkeenottokanyyli tai neula (yksi per **HY**-injektiopullo)




- Ihonalainen neulasarja steriilillä sidoksella (yksi per infuusiokohta)



- Infuusioletkusto



- Elektroninen lääkeannostelija, virtalähde ja käyttöohje



- Tarvittaessa: Keittosuolaliuospussi (jos terveydenhuollon ammattilaisesi niin neuvoo)



- Riskijäteastia



- Infuusiopäiväkirja

*Käytä käsineitä, jos terveydenhuollon ammattilainen niin neuvoo.
[†]Nämä ovat suositellut ruiskun tilavuudet.

Mitä tarvitset

Opeta potilaillesi tai heitä hoitaville henkilöille alla olevat kohdat. Käsittele myös “Korostettavat kohdat.”

Mitä tarvitset


Alla on tarvikkeet, joita tarvitset HyQvia-valmisteen infusointiin. Tarvikkeesi voivat näyttää hieman erilaisilta.



- HyQvia injektiopullo(t)




- Alkoholipyyhkeet, teippi ja puhdas, steriili laastari*



- 20 ml ruisku(t)†




- Tarvittaessa: Steriilit suojakorkit (yksi ruiskua kohti)



- Lääkkeenottokanyyli tai neula (yksi per HY-injektiopullo)




- Ihonalainen neulasarja steriilillä sidoksella (yksi per infuusiokohta)



- Infusioletkusto



- Elektroninen lääkeannostelija, virtalähde ja käyttöohje



- Tarvittaessa: Keittosuolaliuospussi (jos terveydenhuollon ammattilaisesi niin neuvo)



- Riskijäteastia



- Infusiopäiväkirja

*Käytä käsiäsi, jos terveydenhuollon ammattilainen niin neuvo.

†Nämä ovat suositellut ruiskun tilavuudet.

Korostettavat kohdat

Selitä, että potilaiden saamat tarvikkeet voivat näyttää erilaisilta kuin näissä kuvissa. Huomaa, että potilaat voivat halutessaan käyttää tippatelinettä (ei näy tässä).

Varmista, että potilaat tietävät, kuinka monta injektiopulloa heidän tulee saada reseptinsä perusteella. Noudata valmistajan ohjeita, kun käytät tarvikkeita.


✓

Arvioi potilaan tietämys


Varmista, että potilaat tuntevat välineet

Mitä tarvitset


Alla on tarvikkeet, joita tarvitset HyQvia-valmisteen infusointiin. Tarvikkeesi voivat näyttää hieman erilaisilta.




- HyQvia injektiopullo(t)




- Alkoholipyyhkeet, teippi ja puhdas, steriili laastari*




- 20 ml ruisku(t)†




- Tarvittaessa: Steriilit suojakorkit (yksi ruiskua kohti)




- Lääkkeenottokanyyli tai neula (yksi per HY-injektiopullo)




- Ihonalainen neulasarja steriilillä sidoksella (yksi per infuusiokohta)



- Infusioletkusto



- Elektroninen lääkeannostelija, virtalähde ja käyttöohje



- Tarvittaessa: Keittosuolaliuospussi (jos terveydenhuollon ammattilaisesi niin neuvo)




- Riskijäteastia




- Infusiopäiväkirja


Miten ne sopivat yhteen



Siirrä **HY** ruiskuun (ruiskuihin)



Infusoi **HY** (ensin)



Infusoi **IG** lääkeannostelijalla (toiseksi)

Miten ne sopivat yhteen

Opeta potilaillesi tai heitä hoitaville henkilöille alla olevat kohdat. Käsittele myös “Korostettavat kohdat.”

Miten ne sopivat yhteen

A

HyQvia injektiopullo(t)

Lääkkeenottokanyyli tai neula

20 ml ruisku(t)

Siirrä **HY** ruiskuun (ruiskuihin)

B

20 ml ruisku(t)

Ihonalainen neulasarja

Infusoi **HY** (ensin)

C

HyQvia injektiopullo(t)

Tarvittaessa: keittosuolaliuospussi

Infusioletkusto

Elektroninen lääkeannostelija

Infusoi **IG** lääkeannostelijalla (toiseksi)

Korostettavat kohdat

- Selitä, että nämä kaaviot näyttävät, miten **tarvikkeet sopivat yhteen**, ennakoiden seuraavaa viittä kohtaa.
- Näiden kaavioiden avulla voit **korostaa prosessin järjestystä**: siirto ensin, sitten infuusio.

Korosta, HY ennen IG:a. IG-infuusio tulee aloittaa heti **HY**-infuusion päätyttyä (10 minuutin kuluessa).

✓ Arvioi potilaan tietämys
Arvioi kuinka hyvin potilas osaa yhdistää tarvikkeita toisiinsa.

Miten ne sopivat yhteen

A

HyQvia injektiopullo(t)

Lääkkeenottokanyyli tai neula

20 ml ruisku(t)

Siirrä **HY** ruiskuun (ruiskuihin)

B

20 ml ruisku(t)

Ihonalainen neulasarja

Infusoi **HY** (ensin)

C

HyQvia injektiopullo(t)

Tarvittaessa: keittosuolaliuospussi

Infusioletkusto


Elektroninen lääkeannostelija

Infusoi **IG** lääkeannostelijalla (toiseksi)


VAIHE 1 Valmistaudu



Ota **HyQvia**-valmiste pois pakkauksesta ja tarkista se. Anna **HyQvia**-valmisteen lämmetä huoneenlämpöiseksi (tämä voi kestää jopa 60 minuuttia). Älä käytä lämmityslaitteita, kuten mikroaaltouunia. Tarkista väri ja viimeinen käyttöpäivä. Varmista, että neste ei ole sameaa eikä siinä ole hiukkasia. Älä ravista **HyQvia**-valmistetta.




Kerää tarvikkeet.




Puhdista työskentelyalue.



Pese kätesi huolellisesti.



Avaa tarvikkeet terveydenhuollon ammattilaisen ohjeiden mukaisesti.




- Ota **HyQvia**-valmiste pois pakkauksesta ja tarkista se.
- Anna **HyQvia**-valmisteen lämmetä huoneenlämpöiseksi (tämä voi kestää jopa 60 minuuttia).
- Älä käytä lämmityslaitteita, kuten mikroaaltouunia. Tarkista väri ja viimeinen käyttöpäivä. Varmista, että neste ei ole sameaa eikä siinä ole hiukkasia.
- Älä ravista **HyQvia**-valmistetta.


Korostettavat kohdat

Varmista, että **HyQvia**-valmisteen huoneenlämpöistä – älä käytä lämmityslaitteita, kuten mikroaaltouunia.

Tarkista **injektiopullojen** kirkkaus ja väri. **HY**:n tulee olla kirkas ja väritön. **IG**:n tulee olla kirkas ja väritön tai vaaleankeltainen. Huomioi irrotettava etiketti, jonka viimeinen käyttöpäivä, eränumero ja valmistuspäivä merkitään infuusiopäiväkirjaan.



- Kerää tarvikkeet.



- Puhdista työskentelyalue.

Korostettavat kohdat


Valmistele **työskentelyalue**. Ohjeista potilaita löytämään hiljainen työskentelyalue, jossa on riittävästi tilaa.



- Pese kätesi huolellisesti.

Korostettavat kohdat

Huomioi **käsineiden käyttö**. Noudata hoitavan tahosi ohjeita käsineiden käytöstä.



- Avaa tarvikkeet terveydenhuollon ammattilaisen ohjeiden mukaisesti.

Korostettavat kohdat

Selitä **aseptiset tekniikat**.

Pidä **steriilit tarvikkeet avoimissa pakkauksissa** lähellä työskentelyaluetta.


Selvitä **neulasarja** ennen ruiskujen käyttöä.




Arvioi potilaan tietämys

Pyydä potilaita selittämään ”**Vaihe 1: Valmistaudu**” omin sanoin. Kannusta ja korjaa mahdolliset väärinkäsitykset ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä.


VAIHE 2 Valmistele HY




Irrota korkki. Puhdista jokainen **HY**-injektiopullo pyyhkimällä tulppa alkoholipyyhkeellä ja anna kuivua vähintään 30 sekuntia.




Poista 20 ml:n steriili ruisku pakkauksestaan.* Kiinnitä ruiskuun lääkkeenottokanyyli tai neula.



Vedä mäntää taaksepäin täyttääksesi ruisku ilmalla (määrä, joka vastaa **HY**:n koko määrää).



Aseta lääkkeenottokanyyli tai neula **HY**-injektiopullon tulpan keskelle. Työnnä ilma injektiopulloon.



Käännä injektiopullo ylösalaisin. Vedä mäntää taaksepäin vetääksesi kaiken **HY**:n ruiskuun. Toista vaiheet C–E, jos annokseen tarvitaan useampi kuin yksi **HY**-injektiopullo. **Käytä samaa ruiskua, jos mahdollista.**

VINKKI


Suojaa jokainen ruisku steriilillä suojakorkilla, kun täytät useita ruiskuja.

*Tämä on suositeltu ruiskun tilavuus.

VAIHE 2 jatkuu

Vaihe 2 Valmistele HY


Opeta potilaillesi tai heitä hoitaville henkilöille alla olevat kohdat. Käsittele myös “Korostettavat kohdat.”



- Irrota korkki.
- Puhdista jokainen **HY**-injektiopullo pyyhkimällä tulppa alkoholipyyhkeellä ja anna kuivua vähintään 30 sekuntia.

Korostettavat kohdat


Auta tunnistamaan injektiopullot. Injektiopullon kokoerojen lisäksi on huomattava, että **HY-injektiopullon yläosa on hopean värinen ja IG-injektiopullon pinta on poimuinen.**
Korosta, että alkoholin kuivuminen **voi kestää 30 sekuntia.**



- Poista 20 ml:n steriili ruisku pakkauksestaan.*
- Kiinnitä ruiskuun lääkkeenottokanyyli tai neula.


Korostettavat kohdat

Korosta aseptisia tekniikoita, varsinkin potilaille, jotka eivät ole aiemmin käyttäneet ihonalaista infuusiota.
Käytä vain oikeanlaista lääkkeenottokanyyliä tai neulaa. Vääränlainen lääkkeenottokanyyli voi aiheuttaa tulpan työntymisen läpi.



- Vedä mäntää taaksepäin täyttääksesi ruisku ilmalla (määrä, joka vastaa **HY:n** koko määrää).


*Tämä on suositeltu ruiskun tilavuus.



- Aseta lääkkeenottokanyyli tai neula **HY-injektiopullon tulpan keskelle.**
- Työnnä ilma injektiopulloon.

Korostettavat kohdat

Aseta lääkkeenottokanyyli tai neula HY-injektiopullon keskelle, jotta tulppa tai sen osa ei painu läpi.



- Käännä injektiopullo ylösalaisin.
- Vedä mäntää taaksepäin vetääksesi kaiken **HY:n** ruiskuun.
- Toista vaiheet C–E, jos annokseen tarvitaan useampi kuin yksi **HY**-injektiopullo. **Käytä samaa ruiskua, jos mahdollista.**

Korostettavat kohdat

Vedä koko HY-injektiopullon sisältö ruiskuun.

VINKKI


Suojaa jokainen ruisku steriilillä suojakorkilla, kun täytät useita ruiskuja.




Arvioi potilaan tietämys

Pyydä potilaita selittämään ‘**Vaihe 2: Valmistele HY**’ omin sanoin. Kannusta ja korjaa mahdolliset väärinkäsitykset ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä.

VAIHE 2 Valmistele HY




Poista ilmakuplat naputtamalla varovasti. Paina sitten mäntää hitaasti, kunnes **HY** saavuttaa ruiskun kärjen.



Kiinnitä ihonalainen neulasarja **HY**-ruiskuun. Paina mäntää hitaasti täyttääksesi neulasarjan letkun neulan siivekkeisiin asti. Sulje neulasarjan letkun puristin. Merkitse ruisku **HY**.

VAIHE 2 Valmistele HY


Opeta potilaillesi tai heitä hoitaville henkilöille alla olevat kohdat.
Käsitlee myös “Korostettavat kohdat.”



- **Poista ilmakuplat naputtamalla varovasti.**
- Paina sitten mäntää hitaasti, kunnes **HY** saavuttaa ruiskun kärjen.

Korostettavat kohdat

Poista ilmakuplat. Korosta ruiskun naputtamisen merkitystä ilmakuplien poistamiseksi.



- Kiinnitä ihonalainen neulasarja **HY**-ruiskuun.
- Paina mäntää hitaasti täyttääksesi neulasarjan letkun neulan siivekkeisiin asti.
- Sulje neulasarjan letkun puristin.
- Merkitse ruisku **HY**.

Korostettavat kohdat


Keskustele viskositeetista. Muistuta ihonalaisen infuusion tottuneita potilaita siitä, että he eivät välttämättä ole tottuneet **HY**:n alhaiseen viskositeettiin. Männän työntäminen liian kovaa voi ampaista **HY**:n neulasta.

Pysähdy neulan kantaan. Muistuta potilaita täyttämään neulasarjan letku **HY**:llä vain neulan keskiöön asti.


Sulje puristin kuvan osoittamalla tavalla, **kun HY**:n siirto on valmis.

Merkitse ruisku. Korosta, että potilaiden tulee merkitä **HY**-ruisku neulasarjan letkun puristamisen jälkeen.


VAIHE 3 Valmistele IG



Puhdista jokainen **IG**-injektiopullo pyyhkimällä tulppa alkoholipyyhkeellä ja anna kuivua vähintään 30 sekuntia.




Sulje infuusioletkuston puristin.



Aseta infuusioletkuston piikki suoraan **IG**-injektiopullon tulppaan. Käännä injektiopullo ylösalaisin ja ripusta se tippatelineeseen tai koukkuun.




Täytä infuusioletkusto **IG**:llä terveydenhuollon ammattilaisen ohjeiden mukaisesti.



Ohjelmoi lääkeannostelija valmistajan ohjeiden mukaisesti määrättyyn virtausnopeuteen. Sammuta lääkeannostelija.

VAIHE 3 Valmistele IG


Opeta potilaillesi tai heitä hoitaville henkilöille alla olevat kohdat. Käsittele myös “Korostettavat kohdat.”




- Puhdista jokainen **IG**-injektiopullo pyyhkimällä tulppa alkoholipyyhkeellä ja anna kuivua vähintään 30 sekuntia.

Korostettavat kohdat

Korosta, että alkoholin kuivuminen voi kestää 30 sekuntia.




- Sulje infuusioletkuston puristin.



- Aseta infuusioletkuston piikki suoraan **IG**-injektiopullon tulppaan.
- Käännä injektiopullo ylösalaisin ja ripusta se tippatelineeseen tai koukkuun.

Korostettavat kohdat


Korosta, että potilaiden on **avattava** infuusioletkuston venttiili.



- Täytä infuusioletkusto **IG**:llä terveydenhuollon ammattilaisen ohjeiden mukaisesti.

Korostettavat kohdat

Korosta, että potilaiden on **avattava** infuusioletkuston puristin sen täyttämiseksi. Kun letku on täynnä, **sulje venttiili**.




- Ohjelmoi lääkeannostelija valmistajan ohjeiden mukaisesti määrättyyn virtausnopeuteen.
- Sammuta lääkeannostelija.




Arvioi potilaan tietämys

Pyydä potilaita selittämään **’Vaihe 3: Valmistele IG’** omin sanoin. Kannusta ja korjaa mahdolliset väärinkäsitykset ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä.


VAIHE 4 Infusoi HyQvia




Valitse infuusiokohta (tai -kohdat) joko vatsasta tai reidestä. Vältä luisia alueita, näkyviä verisuonia, arpia ja tulehdus- tai infektiolueita. Vaihtelee infuusiokohtaa kehon vastakkaisille puolille infuusioiden välillä.*
Puhdista infuusiokohdat alkoholipyyhkeellä, kuten terveydenhuollon ammattilainen on ohjeistanut. Anna kuivua vähintään 30 sekuntia.




Poista ihonalaisen neulan suojus. Purista vähintään 2,0–2,5 cm ihoa sormien väliin. Työnnä neula nopealla liikkeellä suoraan ihoon 90 asteen kulmassa. Avaa neulasarjan siivekkeet ja kiinnitä neula paikalleen steriilillä sidoksella.




Jos käytetään useampaa kuin yhtä infuusiokohtaa, toista vaiheet A-C. Avaa neulasarjan puristin. Tarkista, että neula on sijoitettu oikein ennen infuusion aloittamista kuten terveydenhuollon ammattilainen on ohjeistanut.



Paina **HY**:a sisältävän pienemmän ruiskun mäntää hitaasti yhdessä infuusiokohdassa alkunopeudella 1–2 ml/min ja suurena nopeutta sietokyvyn mukaan. Jos käytössä on useampi kuin yksi pistoskohta, jaa **HY** tasan kohtien kesken.



Kun **HY** on infusoitu kokonaan, poista ruisku ja kiinnitä sama ihonalainen neula infuusioletkustoon. Älä poista neulaa infuusiokohdasta (-kohdista).




Avaa infuusioletkuston puristin ja käynnistä lääkeannostelija **IG**:n infusoimiseksi lääkärin määräämällä nopeudella. **IG-infuusio on aloitettava 10 minuutin kuluessa HY-infuusion päättymisestä.**

* Potilaille, joiden paino on <40 kg, valitse pistoskohdat kehon vastakkaisilta puolilta, jos on kehoitettu infusoimaan kahdessa pistoskohdassa yli 300 ml:n annoksia
Potilaille, joiden paino on >40 kg, valitse pistoskohdat kehon vastakkaisilta puolilta, jos on kehoitettu infusoimaan kahdessa pistoskohdassa yli 600 ml:n annoksia

VAIHE 4 jatkuu

VAIHE 4 Infusoi HyQvia

Opeta potilaillesi tai heitä hoitaville henkilöille alla olevat kohdat. Käsittele myös “Korostettavat kohdat.”



- Valitse infuusiokohta (tai -kohdat) joko vatsasta tai reidestä.
- Vältä luisia alueita, näkyviä verisuonia, arpia ja tulehdus- tai infektiolueita.
- Vaihtele infuusiokohtaa kehon vastakkaisille puolille infusioiden välillä.*
- **Puhdista infuusiokohdat alkoholipyyhkeellä,** kuten terveydenhuollon ammattilainen on ohjeistanut
- Anna kuivua vähintään 30 sekuntia.


Korostettavat kohdat

Muista HY ennen IG:a.

Käytä kehon vastakkaisia puolia, jos tarvitaan useita infuusiokohtia.

Vältä tiettyjä alueita. HyQvia-hoitoa ei tule infusoida infektoituneelle tai punaiselle, turvonneelle alueelle tai sen ympärille paikallisen infektion leviämiskärsin vuoksi.

Puhdista infuusiokohta. Aloita infuusiokohdan keskeltä ja työskentele ulospäin pyöreällä liikkeellä. Anna kuivua vähintään 30 sekuntia.




- Poista ihonalaisen neulan suojus.
- Purista vähintään 2,0–2,5 cm ihoa sormien väliin
- Työnnä neula nopealla liikkeellä suoraan ihoon 90 asteen kulmassa.
- Avaa neulasarjan siivekkeet ja kiinnitä neula paikalleen steriilillä sidoksella.

Korostettavat kohdat

Arvioi potilaan tietämys. Pyydä potilaita näyttämään, mitä 90 astetta tarkoittaa.

Näytä steriili teippi. Näytä potilaille steriili teippi neulasarjan mukana tulevassa sidoksessa.




- Jos käytetään useampaa kuin yhtä infuusiokohtaa, toista vaiheet A-C.
- Avaa neulasarjan puristin.
- Tarkista, että neula on sijoitettu oikein ennen infuusion aloittamista kuten terveydenhuollon ammattilainen on ohjeistanut.


Korostettavat kohdat

Toista vaiheet tarvittaessa. Muistuta potilaita toistamaan vaiheet A-C, jos he käyttävät useampaa kuin yhtä infuusiokohtaa.

Näytä potilaille, miten letkussa oleva veri tarkistetaan, ja korosta, että neula on poistettava ja vaihdettava.




- Paina **HY**:a sisältävän pienemmän ruiskun mäntää hitaasti yhdessä infuusiokohdassa alkunopeudella 1–2 ml/min ja suurena nopeutta sietokyvyn mukaan.
- Jos käytössä on useampi kuin yksi pistoskohta, jaa **HY** tasan kohtien kesken.



- Kun **HY** on infusoitu kokonaan, poista ruisku ja kiinnitä sama ihonalainen neula infuusioletkustoon.
- Älä poista neulaa infuusiokohdasta (-kohdista).

Korostettavat kohdat

Jätä neula paikoilleen. Korosta, että potilaiden ei tule poistaa neulaa infuusiokohdasta **HY**-infuusion jälkeen.



- Avaa infuusioletkuston puristin ja käynnistä lääkeannostelijaa **IG**:n infusoimiseksi lääkärin määräämällä nopeudella.
- **IG-infuusio on aloitettava 10 minuutin kuluessa HY-infuusion päättymisestä.**

Korostettavat kohdat


Keskustele lääkeannostelijasta. Ohjaa potilaat lääkeannostelijan valmistajan oppaaseen tai apteekkiin.

Hyödynnä taukoja IG-infuusion aikana. Keskustele käytettävissä olevista resursseista. Korosta, milloin ja miten ensiapupakkausta käytetään. Arvioi potilaan itseluottamusta infuusioprosessin suhteen ja määritä miten voit parantaa seuraavaa infuusiokokemusta.


Tarkista, ettei infuusiokohta ole vuotanut. Jos vuotoa tapahtuu, ohjaa potilaat tarkistamaan, onko neula kiinnitetty väärin, onko neulan pituus liian lyhyt, onko infusoitu liikaa tai neula asetettu väärään kulmaan.

Korosta HY ennen IG:a. Muistuta potilaita aloittamaan IG- infuusio 10 minuutin kuluessa HY-infuusion päättymisestä.

VAIHE 4 Infusoi HyQvia



Kun injektiopullo on tyhjä, pysäytä lääkeannostelija ja ohjelmoi tarvittaessa uudelleen. Työnnä infuusioletkuston piikki seuraavaan puhdistettuun **IG**-injektiopulloon 90 asteen kulmassa. Käynnistä sitten lääkeannostelija uudelleen. Toista tämä jokaisen jäljellä olevan **IG**-injektiopullon kohdalla.



- Kun injektiopullo on tyhjä, pysäytä lääkeannostelija ja ohjelmoi tarvittaessa uudelleen.
- Työnnä infusioletkuston piikki seuraavaan puhdistettuun **IG**-injektiopulloon 90 asteen kulmassa.
- Käynnistä sitten lääkeannostelija uudelleen.
- Toista tämä jokaisen jäljellä olevan **IG**-injektiopullon kohdalla.

Korostettavat kohdat

Korosta aseptista tekniikkaa useiden injektiopullojen vaihtojen yhteydessä.

Pyydä potilaita näyttämään, mitä 90 astetta tarkoittaa.

Huomioita infuusion hallintaan


- Tarkista valmistajan ohjeet, mutta lääkeannostelijan tukosten hälytyksen osalta harkitse potilaiden ja heitä hoitavien henkilöiden neuvomista:
- Tarkista infusioletkun kiertymät ja että puristimet ovat auki
 - Varmista, että tukoksen hälytys on asetettu maksimiin
 - Varmista, että ihonalainen neula on 24G ja tarkoitettu suuriin virtausnopeuksiin
 - Tarkista, että lääkeannostelija on hyväksytty käytettäväksi **HyQvia**-hoidon kanssa
- Jos hälytys tukoksesta jatkuu, pienennä virtausnopeutta infuusion loppuun saattamiseksi.




Arvioi potilaan tietämys

Pyydä potilaita selittämään **‘Vaihe 4: Infusoi HyQvia’** omin sanoin. Kannusta ja korjaa mahdolliset väärinkäsitykset ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä.

VAIHE 5 Viimeistele




Jos terveydenhuollon ammattilainen niin ohjeistaa, kun viimeinen **IG**-injektiopullo on tyhjä, poista se ja kiinnitä keittosuolaliuospussi infuusioletkustoon.




Käynnistä lääkeannostelija uudelleen, jotta **IG** imeytyy neulan siivekkeisiin asti.



Sammuta lääkeannostelija ja sulje infuusioletkuston puristin. Irrota letku lääkeannostelijasta.



Poista ihonalainen neulasarja löysäämällä steriiliä sidosta kaikilta reunoilta. Vedä neulan siivekkeet suoraan ylös ja ulospäin. Aseta puhdas steriili side varovasti infuusiokohdan päälle.



Hävitä neulasarja laittamalla se riskijäteastiaan ja heitä pois käyttämätön valmiste injektiopullossa ja kertakäyttöiset tarvikkeet terveydenhuollon ammattilaisen suosituksen mukaisesti.




Kirjaa infuusion tiedot infuusiopäiväkirjaasi.


VAIHE 5 jatkuu

VAIHE 5 Viimeistele


Opeta potilaillesi tai heitä hoitaville henkilöille alla olevat kohdat. Käsittele myös “Korostettavat kohdat” harmaissa laatikoissa.



- Jos terveydenhuollon ammattilainen niin ohjeistaa, kun viimeinen IG-injektiopullo on tyhjä, poista se ja kiinnitä keittosuolaliuospuski infuusioletkustoon.




- Käynnistä lääkeannostelija uudelleen, jotta IG imeytyy neulan siivekkeisiin asti.




- Sammuta lääkeannostelija ja sulje infuusioletkuston puristin.
- Irrota letku lääkeannostelijasta.

Korostettavat kohdat

Korosta aseptista tekniikkaa, kun vaihdat IG 10 % injektiopullosta keittosuolaliuospuskiin



- Poista ihonalainen neulasarja löysäämällä steriiliä sidosta kaikilta reunoilta.
- Vedä neulan siivekkeet suoraan ylös ja ulospäin.
- Aseta puhtas steriili side varovasti infuusiokohdan päälle.



- Hävitä neulasarja laittamalla se riskijäteastiaan ja heitä pois käyttämätön valmiste injektiopullossa ja kertakäyttöiset tarvikkeet terveydenhuollon ammattilaisen suosituksen mukaisesti.

Korostettavat kohdat

Selitä oikea neulankäsittely. Ole erityisen varovainen käsitellessäsi suojaamatonta neulaa. Pidä riskijäteastia valmiina.




- Kirjaa infuusion tiedot infuusiopäiväkirjaasi.

Korostettavat kohdat

Tarkista infuusiopäiväkirja. Selitä, kuinka tärkeää on täyttää jokainen kohta ja tallentaa infuusion päivämäärä, aika, annos, infuusiokohta (-kohdat) ja mahdolliset haittavaikutukset.

Keskustele siitä, miten ja mihin HyQvia-injektiopullon (-pullojen) irrotettavat tarrat kiinnitetään infuusiopäiväkirjaan.


VAIHE 5 Viimeistele



Seuranta terveydenhuollon ammattilaisen ohjeiden mukaisesti.

VAIHE 5 Viimeistele

Opeta potilaillesi tai heitä hoitaville henkilöille alla olevat kohdat.
Käsittele myös “Korostettavat kohdat” harmaissa laatikoissa.



- Seuranta terveydenhuollon ammattilaisen ohjeiden mukaisesti.

Korostettavat kohdat

Kannusta ja tiedota. Kysy, onko potilailla kysyttävää, ja keskustele siitä, milloin ottaa yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

Varmista tarvikkeet seuraavaa infuusiota varten. Varmista, että potilaat ymmärtävät, miten ja milloin tilata lisää tarvikkeita.



Arvioi potilaan tietämys


Pyydä potilaita selittämään ‘Vaihe 5: Viimeistele’ omin sanoin. Harkitse Potilastaitojen Tarkistuslistan käyttämistä koulutuksen dokumentointiin. Määritä miten hyvin potilaat suhtautuvat infuusioprosessiin.

Miltä HyQvia-hoidon antaminen näyttää

HyQvia-infuusion jälkeen infuusiokohdassa saattaa esiintyä turvotusta. Tämä johtuu infusoidun nesteen tilavuudesta, ja sen pitäisi kestää vain muutama päivä.

Ennen HyQvia-hoitoa, sen aikana ja sen jälkeen

Esimerkki **HyQvia**-valmistetta käyttävästä potilaasta. Elimistösi saattaa reagoida **HyQvia**-infuusioon samalla tavalla tai eri tavalla.



Ennen **HyQvia**-infuusiota



Välittömästi **HyQvia**-infuusion jälkeen

HyQvia infusoitu: 235 ml (tilavuus infusoitu terveydenhuollon ammattilaisen ohjeiden mukaisesti tämän potilaan kliinisen tilan perusteella; se voi olla erilainen sinulle).



24 tuntia infuusion jälkeen

Mitkä ovat HyQvia-hoidon mahdolliset haittavaikutukset?

Infuusiokohdassa esiintyy paikallisia reaktioita. Nämä reaktiot häviävät yleensä muutaman päivän kuluessa. Yleisimpiä paikallisia haittavaikutuksia ovat: infuusiokohdan kipu, mukaan lukien lievä tai kohtalainen epämukavuus ja arkuus, punoitus, turvotus, kutina, kovettuminen ja ihottuma.

Kliinisissä tutkimuksissa ihossa ei tapahtunut pitkäaikaisia muutoksia. Infuusiokohdassa esiintyvistä pitkäaikaisista tulehduksesta, kyhmyistä tai tulehduksesta, joka kestää yli muutaman päivän, tulee ilmoittaa terveydenhuollon ammattilaiselle.

Systeemiset haittavaikutukset eivät rajoitu infuusiokohtaan, ja niitä voi esiintyä koko kehossa. Yleisimmät systeemiset haittavaikutukset ovat: päänsärky, väsymys, pahoinvointi, oksentelu, ripuli, vatsakipu, lihas- tai nivelkipu, rintakipu, kuume ja heikotus tai huonovointisuus.

Vakavat haittavaikutukset

HyQvia-valmisteen kaltaisten lääkkeiden infuusiota voivat joskus aiheuttaa vakavia, mutta harvinaisia allergisia reaktioita. Verenpaine voi laskea äkillisesti ja yksittäistapauksissa voi seurata anafylaktinen sokki. Terveydenhuollon ammattilaiset ovat tietoisia näistä mahdollisista haittavaikutuksista ja seuraavat sinua ensimmäisten infuusioiden aikana ja niiden jälkeen.

Tyypillisiä merkkejä tai oireita ovat: pyörryttävä tunne, huimaus tai pyörtyminen, ihottuma ja kutina, suun tai kurkun turvotus, hengitysvaikeudet, hengityksen vinkuminen, epänormaali syke, rintakipu, huulien tai sormien ja varpaiden sinertäminen ja näön sumentuminen.

Kerro välittömästi terveydenhuollon ammattilaiselle, jos huomaat jonkin näistä oireista infuusion aikana.

Miltä HyQvia-hoidon antaminen näyttää

Opeta potilaillesi tai heitä hoitaville henkilöille alla olevat kohdat. Käsittele myös “Korostettavat kohdat”.

Miltä HyQvia-hoidon antaminen näyttää

HyQvia-infuusion jälkeen infuusiokohdassa saattaa esiintyä turvotusta. Tämä johtuu infusoidun nesteen tilavuudesta, ja sen pitäisi kestää vain muutama päivä.

Ennen HyQvia-hoitoa, sen aikana ja sen jälkeen

Esimerkki **HyQvia**-valmistetta käyttävästä potilaasta. Elimistösi saattaa reagoida **HyQvia**-infuusioon samalla tavalla tai eri tavalla.



Ennen **HyQvia**-infuusiota



Välittömästi **HyQvia**-infuusion jälkeen

HyQvia infusioitu: 235 ml (tilavuus infusioitu terveydenhuollon ammattilaisen ohjeiden mukaisesti tämän potilaan klinisen tilan perusteella; se voi olla erilainen sinulle).



24 tuntia infuusion jälkeen

Mitkä ovat HyQvia-hoidon mahdolliset haittavaikutukset?

Infuusiokohdassa esiintyy paikallisia reaktioita. Nämä reaktiot häviävät yleensä muutaman päivän kuluessa. Yleisimpiä paikallisia haittavaikutuksia ovat: infuusiokohdan kipu, mukaan lukien lievä tai kohtalainen epämukavuus ja arkuus, punoitus, turvotus, kutina, kovettuminen ja ihottuma.

Kliinisissä tutkimuksissa ihossa ei tapahtunut pitkäaikaisia muutoksia. Infuusiokohdassa esiintyvistä pitkäaikaisesta tulehduksesta, kyhmyistä tai tulehduksesta, joka kestää yli muutaman päivän, tulee ilmoittaa terveydenhuollon ammattilaiselle.

Systeemiset haittavaikutukset eivät rajoitu infuusiokohtaan, ja niitä voi esiintyä koko kehossa. Yleisimmät systeemiset haittavaikutukset ovat: päänsärky, väsymys, pahoinvointi, oksentelu, ripuli, vatsakipu, lihas- tai nivelkipu, rintakipu, kuume ja heikotus tai huonovointisuus.

Vakavat haittavaikutukset

HyQvia-valmisteen kaltaisten lääkkeiden infuusiot voivat joskus aiheuttaa vakavia, mutta harvinaisia allergisia reaktioita. Verenpaine voi laskea äkillisesti ja yksittäistapauksissa voi seurata anafylaktinen sokki. Terveydenhuollon ammattilaiset ovat tietoisia näistä mahdollisista haittavaikutuksista ja seuraavat sinua ensimmäisten infusioiden aikana ja niiden jälkeen.

Tyypillisiä merkkejä tai oireita ovat: pyörtyävä tunne, huimaus tai pyörtyminen, ihottuma ja kutina, suun tai kurkun turvotus, hengitysvaikeudet, hengityksen vinkuminen, epänormaali syke, rintakipu, huulien tai sormien ja varpaiden sinertyminen ja näön sumentuminen.

Kerro välittömästi terveydenhuollon ammattilaiselle, jos huomaat jonkin näistä oireista infuusion aikana.

Korostettavat kohdat

Selitä, miksi infuusiokohdassa tai sen ympäristössä esiintyy tilapäistä turvotusta.

Lisätietoja paikallisten reaktioiden ja muiden haittavaikutusten hallinnasta on kohdassa “**HyQvia**-hoidon mahdollisten haittavaikutusten hallinta”.

Arvioi potilaan tietämys

Varmista, että potilaat ymmärtävät paikalliset reaktiot, joita voi esiintyä hoidon yhteydessä.

Miltä HyQvia-hoidon antaminen näyttää

HyQvia-infuusion jälkeen infuusiokohdassa saattaa esiintyä turvotusta. Tämä johtuu infusoidun nesteen tilavuudesta, ja sen pitäisi kestää vain muutama päivä.

Ennen HyQvia-hoitoa, sen aikana ja sen jälkeen

Esimerkki **HyQvia**-valmistetta käyttävästä potilaasta. Elimistösi saattaa reagoida **HyQvia**-infuusioon samalla tavalla tai eri tavalla.



Ennen **HyQvia**-infuusiota



Välittömästi **HyQvia**-infuusion jälkeen

HyQvia infusioitu: 235 ml (tilavuus infusioitu terveydenhuollon ammattilaisen ohjeiden mukaisesti tämän potilaan klinisen tilan perusteella; se voi olla erilainen sinulle).



24 tuntia infuusion jälkeen

Mitkä ovat HyQvia-hoidon mahdolliset haittavaikutukset?

Infuusiokohdassa esiintyy paikallisia reaktioita. Nämä reaktiot häviävät yleensä muutaman päivän kuluessa. Yleisimpiä paikallisia haittavaikutuksia ovat: infuusiokohdan kipu, mukaan lukien lievä tai kohtalainen epämukavuus ja arkuus, punoitus, turvotus, kutina, kovettuminen ja ihottuma.

Kliinisissä tutkimuksissa ihossa ei tapahtunut pitkäaikaisia muutoksia. Infuusiokohdassa esiintyvistä pitkäaikaisesta tulehduksesta, kyhmyistä tai tulehduksesta, joka kestää yli muutaman päivän, tulee ilmoittaa terveydenhuollon ammattilaiselle.

Systeemiset haittavaikutukset eivät rajoitu infuusiokohtaan, ja niitä voi esiintyä koko kehossa. Yleisimmät systeemiset haittavaikutukset ovat: päänsärky, väsymys, pahoinvointi, oksentelu, ripuli, vatsakipu, lihas- tai nivelkipu, rintakipu, kuume ja heikotus tai huonovointisuus.

Vakavat haittavaikutukset

HyQvia-valmisteen kaltaisten lääkkeiden infuusiot voivat joskus aiheuttaa vakavia, mutta harvinaisia allergisia reaktioita. Verenpaine voi laskea äkillisesti ja yksittäistapauksissa voi seurata anafylaktinen sokki. Terveydenhuollon ammattilaiset ovat tietoisia näistä mahdollisista haittavaikutuksista ja seuraavat sinua ensimmäisten infusioiden aikana ja niiden jälkeen.

Tyypillisiä merkkejä tai oireita ovat: pyörtyävä tunne, huimaus tai pyörtyminen, ihottuma ja kutina, suun tai kurkun turvotus, hengitysvaikeudet, hengityksen vinkuminen, epänormaali syke, rintakipu, huulien tai sormien ja varpaiden sinertyminen ja näön sumentuminen.

Kerro välittömästi terveydenhuollon ammattilaiselle, jos huomaat jonkin näistä oireista infuusion aikana.

FI/HYQ/015/02.2024 - 2.0

13

HyQvia-hoidon mahdollisten haittavaikutusten hallinta

Paikalliset haittavaikutukset

Infuusiokohdassa voi esiintyä seuraavia paikallisia reaktioita, jotka yleensä häviävät muutaman päivän kuluessa. Ota aina yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen saadaksesi selville, miten voit parhaiten hallita paikallisia reaktioita, jotka muuttuvat vakavammaksi tai jatkuvat yli muutaman päivän.

Epämukavuus tai kipu infuusiokohdassa, kun asetat ihonalaisen neulan

- Poista neula, koska se voi olla lihaksessasi
- Ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, jos voimakas kipu ei laannu, kun poistat neulan tai jos se tapahtuu joka kerta, kun infusoit
- Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen tai apteekkihenkilökunnan kanssa neulan pituuden vaihtamisesta; se voi olla liian pitkä sinulle. Ihonalaisen kudoksen paksuus voi vaihdella henkilöiden välillä iän, sukupuolen, painon ja infuusiokohdan mukaan
- Merkitse infuusiopäiväkirjaan, että tämä pistoskohta ei ehkä toimi sinulle

Epämukavuus, kipu tai punoitus infuusiokohdassa infuusion aikana tai sen jälkeen

- Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, joka saattaa hidastaa infuusiota tai lopettaa sen
- Aseta puhdas, lämmin tai kylmä kangas/pesulappu ärtyneelle alueelle lyhyiksi hetkiksi (enintään 10 minuuttia) kerrallaan terveydenhuollon ammattilaisen antamien ohjeiden mukaisesti
- Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa mahdollisesta allergiasta teipille tai sidokselle tai lievän kipulääkkeen mahdollisesta käytöstä

Turvotus infuusiokohdassa tai sen ympärillä

HyQvia-infuusion jälkeen voi esiintyä tilapäistä turvotusta infusoidun nesteen tilavuuden vuoksi.

- Aseta puhdas, lämmin kangas/pesulappu hetkeksi (enintään 5–10 minuuttia) turvonneeseen kohtaan
- Terveydenhuollon ammattilainen voi neuvoa sinua kävelemään ympäriinsä tai hieromaan turvotusta hellävaraisesti

Kutina tai ihottuma infuusiokohdassa tai sen ympärillä

- Hidasta tai lopeta infuusio
- Aseta puhdas, kylmä kangas/pesulappu kutisevalle alueelle lyhyiksi hetkiksi (enintään 10 minuuttia) kerrallaan
- Kun valmistelet ihonalaista neulaa, varo, ettei HyQvia-valmistetta pääsee valumaan neulan ulkopinnalle
- Keskustele tarvittaessa terveydenhuollon ammattilaisen kanssa mahdollisesta antihistamiinin käytöstä, jos sitä suositellaan
- Jos sinulla ilmenee hallitsematonta kutinaa tai ihottumaa/nokkosihottumaa, lopeta infuusio välittömästi ja ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen tai hätäkeskukseen; nämä voivat olla merkkejä vakavasta allergisesta reaktiosta

Systeemiset haittavaikutukset

Systeemiset haittavaikutukset vaikuttavat pikemminkin koko kehoon kuin tiettyyn osaan. Yleisimmät systeemiset haittavaikutukset ovat:

Päänsärky

- Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ilman reseptiä saatavan tulehduskipulääkkeen käytöstä
- Ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, jos päänsärky jatkuu tai pahenee

Väsymys

- Lepää infuusion jälkeen
- Mene nukkumaan aikaisin infuusiopäivänä

Kuume

- Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa käsikauppalääkkeen käytöstä kuumeen alentamiseksi
- Ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, jos kuume jatkuu tai pahenee

Muita harvinaisempia haittavaikutuksia on lueteltu **HyQvia**-valmisteen pakkausselosteessa, mukaan lukien vakavat mutta harvinaiset allergiset reaktiot. On myös mahdollista, että sinulla saattaa esiintyä haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu **HyQvia**-valmisteen pakkausselosteessa. Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, jos sinulla ilmenee haittavaikutuksia, erityisesti sellaisia, joita ei ole mainittu pakkausselosteessa, jotka ovat vakavia tai kestävät yli pari päivää.

Huomioi: yllä olevat ehdotukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisen ohjeita/neuvoja.

Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan Takedalle tai Fimealle:

AE.FIN@takeda.com

**www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA**

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

HyQvia-hoidon mahdollisten haittavaikutusten hallinta

Opeta potilaillesi tai heitä hoitaville henkilöille alla olevat kohdat. Käsittele myös “Korostettavat kohdat”.

HyQvia-hoidon mahdollisten haittavaikutusten hallinta

Paikalliset haittavaikutukset

Infuusiokohdassa voi esiintyä seuraavia paikallisia reaktioita, jotka yleensä häviävät muutaman päivän kuluessa. Ota aina yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen saadaksesi selville, miten voit parhaiten hallita paikallisia reaktioita, jotka muuttuvat vakavammaksi tai jatkuvat yli muutaman päivän.

Epämukavuus tai kipu infuusiokohdassa, kun asetat ihonalaisen neulan

- Poista neula, koska se voi olla lihaksessasi
- Ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, jos voimakas kipu ei laannu, kun poistat neulan tai jos se tapahtuu joka kerta, kun infusoi
- Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen tai apteekkihenkilökunnan kanssa neulan pituuden vaihtamisesta; se voi olla liian pitkä sinulle. Ihonalaisen kudoksen paksuus voi vaihdella henkilöiden välillä iän, sukupuolen, painon ja infuusiokohdan mukaan
- Merkitse infuusiopäiväkirjaan, että tämä pistoskohta ei ehkä toimi sinulle

Epämukavuus, kipu tai punoitus infuusiokohdassa infuusion aikana tai sen jälkeen

- Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, joka saattaa hidastaa infuusiota tai lopettaa sen
- Aseta puhdas, lämmin tai kylmä kangas/pesulappu ärtyneelle alueelle lyhyiksi hetkiksi (enintään 10 minuuttia) kerrallaan terveydenhuollon ammattilaisen antamien ohjeiden mukaisesti
- Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa mahdollisesta allergiasta teipille tai sidokselle tai lievän kipulääkkeen mahdollisesta käytöstä

Turvotus infuusiokohdassa tai sen ympärillä

HyQvia-infuusion jälkeen voi esiintyä tilapäistä turvotusta infusoidun nesteen tilavuuden vuoksi.

- Aseta puhdas, lämmin kangas/pesulappu hetkeksi (enintään 5–10 minuuttia) turvonneeseen kohtaan
- Terveydenhuollon ammattilainen voi neuvoa sinua kävelemään ympäriinsä tai hieromaan turvotusta hellävaraisesti

Kutina tai ihottuma infuusiokohdassa tai sen ympärillä

- Hidasta tai lopeta infuusio
- Aseta puhdas, kylmä kangas/pesulappu kutisevalle alueelle lyhyiksi hetkiksi (enintään 10 minuuttia) kerrallaan
- Kun valmistelet ihonalaista neulaa, varo, ettei **HyQvia**-valmistetta pääsee valumaan neulan ulkopinnalle
- Keskustele tarvittaessa terveydenhuollon ammattilaisen kanssa mahdollisesta antihistamiinin käytöstä, jos sitä suositellaan
- Jos sinulla ilmenee hallitsematonta kutinaa tai ihottumaa/nokkosihottumaa, lopeta infuusio välittömästi ja ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen tai hätäkeskukseen; nämä voivat olla merkkejä vakavasta allergisesta reaktiosta

Systeemiset haittavaikutukset

Systeemiset haittavaikutukset vaikuttavat pikemminkin koko kehoon kuin tiettyyn osaan. Yleisimmät systeemiset haittavaikutukset ovat:

Päänsärky

- Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ilman reseptiä saatavan tulehduskipulääkkeen käytöstä
- Ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, jos päänsärky jatkuu tai pahenee

Väsymys

- Lepää infuusion jälkeen
- Mene nukkumaan aikaisin infuusiopäivänä

Kuume

- Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa käsikauppalääkkeen käytöstä kuumeen alentamiseksi
- Ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, jos kuume jatkuu tai pahenee

Korostettavat kohdat

Harkitse tämän sivun lukemista potilaidesi kanssa varmistaaksesi, että heillä on laaja ymmärrys mahdollisista paikallisista ja systeemisistä haittavaikutuksista.

Arvioi potilaan tietämys

Varmista, että potilailla on laaja käsitys mahdollisista paikallisista ja systeemisistä haittavaikutuksista.

HyQvia-hoidon mahdollisten haittavaikutusten hallinta

Paikalliset haittavaikutukset

Infuusiokohdassa voi esiintyä seuraavia paikallisia reaktioita, jotka yleensä häviävät muutaman päivän kuluessa. Ota aina yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen saadaksesi selville, miten voit parhaiten hallita paikallisia reaktioita, jotka muuttuvat vakavammaksi tai jatkuvat yli muutaman päivän.

Epämukavuus tai kipu infuusiokohdassa, kun asetat ihonalaisen neulan

- Poista neula, koska se voi olla lihaksessasi
- Ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, jos voimakas kipu ei laannu, kun poistat neulan tai jos se tapahtuu joka kerta, kun infusoi
- Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen tai apteekkihenkilökunnan kanssa neulan pituuden vaihtamisesta; se voi olla liian pitkä sinulle. Ihonalaisen kudoksen paksuus voi vaihdella henkilöiden välillä iän, sukupuolen, painon ja infuusiokohdan mukaan
- Merkitse infuusiopäiväkirjaan, että tämä pistoskohta ei ehkä toimi sinulle

Epämukavuus, kipu tai punoitus infuusiokohdassa infuusion aikana tai sen jälkeen

- Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, joka saattaa hidastaa infuusiota tai lopettaa sen
- Aseta puhdas, lämmin tai kylmä kangas/pesulappu ärtyneelle alueelle lyhyiksi hetkiksi (enintään 10 minuuttia) kerrallaan terveydenhuollon ammattilaisen antamien ohjeiden mukaisesti
- Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa mahdollisesta allergiasta teipille tai sidokselle tai lievän kipulääkkeen mahdollisesta käytöstä

Turvotus infuusiokohdassa tai sen ympärillä

HyQvia-infuusion jälkeen voi esiintyä tilapäistä turvotusta infusoidun nesteen tilavuuden vuoksi.

- Aseta puhdas, lämmin kangas/pesulappu hetkeksi (enintään 5–10 minuuttia) turvonneeseen kohtaan
- Terveydenhuollon ammattilainen voi neuvoa sinua kävelemään ympäriinsä tai hieromaan turvotusta hellävaraisesti

Kutina tai ihottuma infuusiokohdassa tai sen ympärillä

- Hidasta tai lopeta infuusio
- Aseta puhdas, kylmä kangas/pesulappu kutisevalle alueelle lyhyiksi hetkiksi (enintään 10 minuuttia) kerrallaan
- Kun valmistelet ihonalaista neulaa, varo, ettei **HyQvia**-valmistetta pääsee valumaan neulan ulkopinnalle
- Keskustele tarvittaessa terveydenhuollon ammattilaisen kanssa mahdollisesta antihistamiinin käytöstä, jos sitä suositellaan
- Jos sinulla ilmenee hallitsematonta kutinaa tai ihottumaa/nokkosihottumaa, lopeta infuusio välittömästi ja ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen tai hätäkeskukseen; nämä voivat olla merkkejä vakavasta allergisesta reaktiosta

Systeemiset haittavaikutukset

Systeemiset haittavaikutukset vaikuttavat pikemminkin koko kehoon kuin tiettyyn osaan. Yleisimmät systeemiset haittavaikutukset ovat:

Päänsärky

- Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ilman reseptiä saatavan tulehduskipulääkkeen käytöstä
- Ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, jos päänsärky jatkuu tai pahenee

Väsymys

- Lepää infuusion jälkeen
- Mene nukkumaan aikaisin infuusiopäivänä

Kuume

- Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa käsikauppalääkkeen käytöstä kuumeen alentamiseksi
- Ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, jos kuume jatkuu tai pahenee

Paikalliset haittavaikutukset

Muita harvinaisempia haittavaikutuksia on lueteltu **HyQvia**-valmisteen pakkausselosteessa, mukaan lukien vakavat mutta harvinaiset allergiset reaktiot. On myös mahdollista, että sinulla saattaa esiintyä haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu **HyQvia**-valmisteen pakkausselosteessa. Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, jos sinulla ilmenee haittavaikutuksia, erityisesti sellaisia, joita ei ole mainittu pakkausselosteessa, jotka ovat vakavia tai kestävät yli pari päivää.

Huomioi: yllä olevat ehdotukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisen ohjeita/neuvoja.

Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan Takedalle tai Fimealle:

AE.FIN@takeda.com

Korostettavat kohdat

Harkitse tämän sivun lukemista potilaidesi kanssa varmistaaksesi, että heillä on laaja ymmärrys mahdollisista paikallisista ja systeemisistä haittavaikutuksista.

Arvioi potilaan tietämys

Varmista, että potilailla on laaja käsitys mahdollisista paikallisista ja systeemisistä haittavaikutuksista.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

AE.FIN@takeda.com

FI/HYQ/015/02.2024 - 2.0

14

Lisämateriaalia

Hyödyllisiä PID-yhteisöjä ja tukiorganisaatioita

Yhteisöryhmiin ja potilaiden edunvalvontajärjestöihin liittyminen on toinen tapa hallita primaaria immuunikatoa (PID). Näistä organisaatioista voi olla hyötyä.

International Patient Organisation for Primary Immunodeficiencies (IPOP)

<http://www.ipopi.org/>

Jeffrey Modell Foundation

<http://info4pi.org/>

European Society for Immunodeficiencies (ESID)

<http://esid.org/>

Hyödyllisiä PID-yhteisöjä ja tukiorganisaatioita

Yhteisöryhmiin ja potilaiden edunvalvontajärjestöihin liittyminen on toinen tapa hallita primaaria immuunikatoa (PID). Näistä organisaatioista voi olla hyötyä.

International Patient Organisation for Primary Immunodeficiencies (IPOPI)


<http://www.ipopi.org/>


Jeffrey Modell Foundation

<http://info4pi.org/>

European Society for Immunodeficiencies (ESID)

<http://esid.org/>





Lähteet

- 1. HyQvia suomenkielinen valmisteyhteenvedo. Saatavilla: https://www.ema.europa.eu/fi/documents/product-information/hyqvia-epar-product-information_fi.pdf.
- 2. Takeda Data on file, VV-MED-8865.
- 3. CarepathRx. PATIENT EDUCATION HyQvia Continuous Subcutaneous Infusion Via CADD Solis Pump [englanniksi]. Saatavilla: <https://carepathrxllc.com/wp-content/uploads/2021/06/30.-HYQVIA-Continuous-Subcutaneous-Infusion-via-CADD-Solis.pdf>. Viitattu marraskuu 2021.
- 4. National Prescribing Service Limited MEDICINEWISE. Consumer medicine information [englanniksi]. Available at: <https://www.nps.org.au/medicine-finder/hyqvia-solution-for-infusion>. Viitattu marraskuu 2021.

Yhteystiedot ja koulutusmateriaalien paperiversiot

Takeda Oy
Puh.: 0800 774 051
Sähköposti: medinfoEMEA@takeda.com