

Idacio[®] Patientkort

Detta kort sammanfattar viktig säkerhetsinformation som du behöver känna till före och under behandling med Idacio[®]

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret, PB 55, 00034 Fimea (webbplats: www.fimea.fi).

Detta kort sammanfattar viktig säkerhetsinformation som du behöver känna till före och under behandling med Idacio®.

- Ha detta kort i närheten när du behandlas med Idacio® och de följande 70 dagarna efter den sista injektionen.
- Visa kortet för all hälso- och sjukvårdspersonal som du har kontakt med.
- Skriv upp på baksidan av kortet alla tuberkulostest som tagits eller tuberkulosbehandlingar som du fått.

Introduktion

IDACIO® är ett läkemedel som används för behandling av vissa sjukdomar som har med immunförsvaret att göra. Medan Idacio® kan vara effektiv i att behandla dessa sjukdomar, kan vissa patienter få en eller flera biverkningar. Det är viktigt att prata med din läkare om möjliga fördelar och möjliga biverkningar med Idacio®. Dessa kan vara olika för varje person.

-
- Detta kort beskriver vissa av de biverkningar som du kan få när du tar Idacio®
 - Exempel på allvarliga biverkningar som kan förekomma är infektioner, cancer och problem med nervsystemet. Detta är inte en fullständig lista över alla eventuella biverkningar med Idacio®.

Innan behandling med Idacio®

Tala om för din läkare om du har några hälsoproblem eller om du tar några läkemedel. Det hjälper dig och din läkare att ta beslut om Idacio® är rätt för dig.

Berätta för din läkare om du:

- har en infektion eller infektionssymtom, såsom feber, sår, utmattning eller tandproblem
- har tuberkulos eller om du varit i kontakt med någon som har tuberkulos
- har eller har haft cancer
- har domningar, stickningar eller problem med nervsystemet, såsom multipel skleros.

Din läkare bör försäkra sig om att du inte har tecken eller symtom på tuberkulos innan du påbörjar Idacio®-behandlingen. Du kan behöva behandling mot tuberkulos innan behandling med Idacio® kan påbörjas.

Vaccinationer

- Du får ta vaccinationer, förutom levande vacciner.
- Om du använde Idacio® medan du var gravid är det viktigt att du informerar din babys läkare innan din baby får något vaccin. Din baby får inte ges ett levande vaccin, t ex ett BCG-vaccin (som används för att förebygga tuberkulos), inom 5 månader efter din sista injektion med Idacio® under din graviditet.

Under behandlingen med Idacio®

För att säkerställa att Idacio® fungerar rätt och säkert för dig bör du hålla regelbunden kontakt med din läkare för att berätta hur du mår. Tala omedelbart om för din läkare om det sker några förändringar i det hur du mår.

Håll din läkare informerad om hur Idacio®-behandlingen fungerar för dig.

- Det är viktigt att du ringer din läkare omgående när du upptäcker några ovanliga symtom.

Det säkerställer att du får rätt vård, vilket minskar risken att en biverkning förvärras.

- Många biverkningar, inklusive infektioner, kan behandlas om du informerar din läkare omgående.
- Om du får en biverkning kommer din läkare att avgöra om du ska fortsätta med Idacio®-behandlingen eller inte. Det är viktigt att du pratar med din läkare för att upptäcka vad som passar just dig.

-
- Eftersom biverkningar kan förekomma efter att du tagit den sista dosen Idacio®, informera din läkare om eventuella problem du får upp till 70 dagar efter din sista Idacio®-injektion.

Informera din läkare:

- om varje ändring i din hälsa du upplever
- om varje nytt läkemedel du tar
- om du ska genomgå en operation.

Vissa personer som behandlas med Idacio® kan få allvarliga biverkningar, som kan innefatta:

Infektioner

- Idacio® används för behandling av vissa inflammationssjukdomar och fungerar genom att blockera en del av immunförsvaret. Denna del av immunförsvaret deltar dock också i bekämpning av infektioner. Detta kan göra att du löper större risk för att utveckla infektioner eller att befintliga infektioner förvärras, såsom förkylningar eller i allvarligare fall tuberkulos.

Paranova Oy
Råtorpsvägen 41 C
01640 Vanda

För mer information:
Tel: +358 9 4391 850
@: info@paranova.fi

Direktdistributörens riskhanteringsmaterial
godkänt 12/2019