

Idacio[®] potilaskortti

Tässä kortissa on tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja, joista sinun on oltava tietoinen ennen Idacio[®]-hoitoa ja sen aikana.

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista osoitteeseen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA ([www-sivusto: www.fimea.fi](http://www.sivusto: www.fimea.fi)).

Tässä kortissa on tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja, joista sinun on oltava tietoinen ennen Idacio®-hoitoa ja sen aikana.

- Pidä tämä kortti mukanasasi aina ja vielä 70 päivän ajan viimeisen Idacio®-injektion jälkeen.
- Näytä tämä kortti kaikille terveydenhuollon ammattilaisille, joiden vastaanotolla käyt.
- Merkitse tehdyt tuberkuloositestit ja tuberkuloosiin mahdollisesti annettu hoito tämän kortin takasivulle.

Johdanto

IDACIO® on lääke, joka on tarkoitettu immuunijärjestelmän erääseen osaan vaikuttavien tiettyjen sairauksien hoitoon. Idacio® voi tehotä näiden sairauksien hoitoon, mutta joillekin potilaille voi ilmetä yksi tai useita haittavaikutuksia. On tärkeää keskustella lääkärin kanssa Idacio®-hoidon mahdollisista hyödyistä ja mahdollisista haittavaikutuksista. Nämä voivat olla kullakin henkilöllä erilaisia.

- Tässä kortissa on tietoja joistakin Idacio®-hoidon haittavaikutuksista.
- Vakavia haittavaikutuksia voivat olla mm. infektiot, syöpä ja hermoston häiriöt. Idacio®-valmisteen mahdolliset haittavaikutukset eivät kuitenkaan rajoitu näihin.

Ennen Idacio®-hoitoa

- Kerro lääkärille mahdollisista sairauksistasi ja mahdollisesti jo käyttämästäsi lääkkeitä, jotta voitte lääkärin kanssa päättää, sopiiko Idacio®-hoito sinulle.

Kerro lääkärille

- jos sinulla on jokin infektio tai infektion oireita (esim. kuumetta, haavoja, väsymystä tai hammasvaivoja)

- jos sinulla on tuberkuloosi tai olet ollut läheisessä kosketuksessa tuberkuloosia sairastavan henkilön kanssa
- jos sinulla on tai on aiemmin ollut syöpä
- jos sinulla on tunnottomuutta, kihelmöintiä tai jokin hermostoon vaikuttava sairaus, kuten MS-tauti (multippeliskleroosi).

Lääkärin pitää tutkia sinulta tuberkuloosin oireet ja siihen viittaavat merkit ennen Idacio®-hoidon aloittamista. Saatat tarvita hoitoa tuberkuloosiin ennen Idacio®-hoidon aloittamista.

Rokotukset

- Sinulle voidaan antaa rokotuksia, mutta ei eläviä taudinaiheuttajia sisältäviä rokotteita.
- Jos saat Idacio®-hoitoa raskauden aikana, siitä on tärkeää kertoa lapsesi lääkärille, ennen kuin lapsesi saa mitään rokotuksia. Lapsellesi ei saa antaa eläviä taudinaiheuttajia sisältäviä rokotteita, esim. BCG-rokotetta (tuberkuloosia vastaan) 5 kuukauteen raskauden aikana viimeksi saamastasi Idacio®-injektiosta.

Idacio®-hoidon aikana

Jotta Idacio®-hoito vaikuttaa asianmukaisesti ja on sinulle turvallinen, käy lääkärissä säännöllisesti keskustelemassa voinnistasi. Kerro lääkärille heti, jos voinnissasi tapahtuu muutoksia.

Pidä hoitava lääkäri ajan tasalla siitä, miten Idacio®-hoito vaikuttaa vointiisi.

- On tärkeää, että soitat heti hoitavalle lääkärille, jos huomaat epätavallisia oireita, jotta saat varmasti viipymättä oikeanlaista hoitoa. Näin myös

haittavaikutusten pahenemisen todennäköisyys vähenee.

- Moni haittavaikutus, kuten infektiot, voidaan hoitaa, jos kerrot niistä heti lääkärille.
- Jos sinulla ilmenee jokin haittavaikutus, lääkäri päättää, jatketaanko Idacio®-hoitoasi vai lopetetaanko se. On tärkeää selvittää lääkärin kanssa, mikä sopii sinulle.

- Haittavaikutuksia voi ilmaantua viimeisen Idacio®-annoksen jälkeenkin, joten kerro oireista lääkärille. Haittavaikutuksia voi ilmaantua vielä 70 päivän ajan viimeisen Idacio®-injektion jälkeen.

Kerro lääkärille

- sinulla mahdollisesti ilmenevistä uusista sairauksista
- mahdollisesti käyttämästäsi uusista lääkkeitä
- sinulle mahdollisesti suunniteltavista leikkauksista tai toimenpiteistä.

Joillekin Idacio®-hoitoa saaville potilaille voi ilmaantua vakavia haittavaikutuksia, joita voivat olla:

Infektiot

- IDACIO® -valmistetta käytetään tiettyjen tulehdussairauksien hoitoon, sillä Idacio® estää immuunijärjestelmän erään osan toimintaa. Kyseinen immuunijärjestelmän osa kuitenkin osallistuu myös infektioiden torjumiseen. Tämä tarkoittaa, että Idacio®-hoidon seurauksena infektioiden puhkeaminen tai jo olemassa olevien infektioiden paheneminen voi olla todennäköisempää. Tällaisia infektioita voivat olla esimerkiksi vilustumistaudit tai vakavammat infektiot, kuten tuberkuloosi.

Paranova Oy
Rajatorpantie 41 C
01640 Vanda

Lisätietoja:
P: +358 9 4391 850
@: info@paranova.fi

Suorajakelijan riskienminimointimateriaalin
hyväksymispäivämäärä 12/2019