

# Idacio<sup>®</sup> potilaskortti

Tässä kortissa on tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja, joista sinun on oltava tietoinen ennen lapsesi Idacio<sup>®</sup>-hoitoa ja sen aikana.

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista osoitteeseen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA (www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)).

## **Tässä kortissa on tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja, joista sinun on oltava tietoinen ennen lapsesi Idacio®-hoitoa ja sen aikana.**

- Pidä tämä kortti mukanasasi / lapsen mukana aina ja vielä 70 päivän ajan lapsen viimeisen Idacio®-injektion jälkeen.
- Näytä tämä kortti kaikille lääkäreille tai muille terveydenhuollon ammattilaisille, joiden vastaanotolla lapsi käy.
- Merkitse lapselle tehty tuberkuloositestit ja tuberkuloosiin mahdollisesti annettu hoito tämän kortin takasivulle.

### **Johdanto**

IDACIO® on lääke, joka on tarkoitettu immuunijärjestelmän erääseen osaan vaikuttavien tiettyjen sairauksien hoitoon. Idacio® voi tehotä näiden sairauksien hoitoon, mutta joillekin potilaille voi ilmetä yksi tai useita haittavaikutuksia. On tärkeää keskustella lääkärin kanssa Idacio®-hoidon mahdollisista hyödyistä ja mahdollisista haittavaikutuksista. Nämä voivat olla kullakin henkilöllä erilaisia.

- Tässä kortissa on tietoja joistakin Idacio®-hoidon haittavaikutuksista.
- Vakavia haittavaikutuksia voivat olla mm. infektiot, syöpä ja hermoston häiriöt. Idacio®-valmisteen mahdolliset haittavaikutukset eivät kuitenkaan rajoitu näihin.

### **Ennen Idacio®-hoitoa**

Kerro lastasi hoitavalle lääkärille lapsella mahdollisesti jo olevista sairauksista ja hänen mahdollisesti käyttämistään lääkkeitä, jotta voitte lääkärin kanssa päättää, sopiiko Idacio®-hoito lapsellesi.

### **Kerro lasta hoitavalle lääkärille**

- jos lapsella on jokin infektio tai infektion oireita (esim. kuumetta, haavoja, väsymystä tai hammasvaivoja)

- jos lapsella on tuberkuloosi tai hän on ollut läheisessä kosketuksessa tuberkuloosia sairastavan henkilön kanssa
- jos lapsella on tai on aiemmin ollut syöpä
- jos lapsella on tunnottomuutta, kihelmöintiä tai jokin hermostoon vaikuttava sairaus, kuten MS-tauti (multippeliskleroosi).

Hoitavan lääkärin pitää tutkia lapseltasi tuberkuloosin oireet ja siihen viittaavat merkit ennen Idacio®-hoidon aloittamista. Lapsesi saattaa tarvita hoitoa tuberkuloosiin ennen Idacio®-hoidon aloittamista.

### **Rokotukset**

- Lääkäri saattaa ehdottaa tiettyjen rokotusten antamista lapsellesi ennen Idacio®-hoidon aloittamista. Lapselle ei saa antaa eläviä taudinaiheuttajia sisältäviä rokotteita Idacio®-hoidon aikana. Jos lapsesi saa Idacio®-hoitoa raskauden aikana, siitä on tärkeää kertoa vauvan lääkärille, ennen kuin vauva saa mitään rokotuksia. Vauvalle ei saa antaa eläviä taudinaiheuttajia sisältäviä rokotteita, esim. BCG-rokotetta (tuberkuloosia vastaan) 5 kuukauteen lapsesi raskauden aikana viimeksi saamasta Idacio®-injektiosta.

### **Idacio®-hoidon aikana**

Jotta Idacio®-hoito vaikuttaa asianmukaisesti ja on lapsellesi turvallinen, käykää lääkärissä säännöllisesti keskustelemassa lapsesi voinnista. Kerro lääkärille heti, jos lapsen voinnissa tapahtuu muutoksia.

Pidä lasta hoitava lääkäri ajan tasalla siitä, miten Idacio®-hoito vaikuttaa lapseesi.

- On tärkeää, että soitat heti lasta hoitavalle lääkärille, jos huomaat epätavallisia oireita, jotta lapsi saa varmasti viipymättä oikeanlaista hoitoa.

Näin myös haittavaikutusten pahenemisen todennäköisyys vähenee.

- Moni haittavaikutus, kuten infektiot, voidaan hoitaa, jos kerrot niistä heti lapsen lääkärille.
- Jos lapsellasi ilmenee jokin haittavaikutus, lapsen lääkäri päättää, jatketaanko Idacio®-hoitoa vai lopetetaanko se. On tärkeää selvittää lääkärin kanssa, mikä lapsellesi sopii.

- Haittavaikutuksia voi ilmaantua lapselle annetun viimeisen Idacio®-annoksen jälkeenkin, joten kerro lapselle ilmaantuvista oireista lääkärille. Haittavaikutuksia voi ilmaantua vielä 70 päivän ajan viimeisen Idacio®-injektion jälkeen.

### **Kerro lapsesi lääkärille**

- lapsella mahdollisesti ilmenevistä uusista sairauksista
- lapsen mahdollisesti käyttämistä uusista lääkkeitä
- lapselle mahdollisesti suunniteltavista leikkauksista tai toimenpiteistä.

### **Joillekin Idacio®-hoitoa saaville potilaille voi ilmaantua vakavia haittavaikutuksia, joita voivat olla:**

#### **Infektiot**

- IDACIO® -valmistetta käytetään tiettyjen tulehdussairauksien hoitoon, sillä Idacio® estää immuunijärjestelmän erään osan toimintaa. Kyseinen immuunijärjestelmän osa kuitenkin osallistuu myös infektioiden torjumiseen. Tämä tarkoittaa, että Idacio®-hoidon seurauksena infektioiden puhkeaminen tai jo olemassa olevien infektioiden paheneminen voi olla lapsellasi todennäköisempää. Tällaisia infektioita voivat olla esimerkiksi vilustumistaudit tai vakavammat infektiot, kuten tuberkuloosi.



Paranova Oy  
Rajatorpantie 41 C  
01640 Vanda

Lisätietoja:  
P: +358 9 4391 850  
@: info@paranova.fi

Suorajakelijan riskienminimointimateriaalin  
hyväksymispäivämäärä 12/2019