



## U sivuvaikutukset

Teriflunomidi vähentää immuunijärjestelmän aktiivisuutta (immunomodulaattori). Joillekin henkilöille teriflunomidi voi aiheuttaa maksavaurion (hepatiitti) ja se voi myös vähentää infektioiden torjuntaan osallistuvien valkosolujen (neutrofiilit) sekä verihiutaleiden, jotka osallistuvat veren hyytymiseen, tuotantoa. Maksasi toimintaa osoittavat testit sekä verenpaineen mittausta tulisi tehdä säännöllisesti teriflunomidi hoidon aikana ja kokoverenkuva tulisi tutkia tarpeen mukaan. Nämä testit tulisi tehdä myös ennen hoidon aloittamista.

### Jos sinulla on jokin seuraavista sivuvaikutuksista ota välittömästi yhteyttä lääkäriin:

- @ (keltatauti), selittämätöntä pahoinvointia tai oksentelua, tai normaalia tummempaa virtsaa. Nämä ovat maksasairauden oireita.
- Merkkejä infektiosta, mukaanlukien kipu virtsatessa, sekavuus, kohonnut ruumiinlämpö (kuume), yskä, turvonneet rauhaset.

## V , mukaan lukien tytöt ja heidän vanhempansa/huoltajansa:

- Teriflunomidia ei tule käyttää raskauden aikana tai , jos he eivät käytä ehkäisyä, koska se voi aiheuttaa vakavia sikiöön kohdistuvia haittoja.
- Älä aloita teriflunomidia kun raskaana tai jos saatat olla raskaana. Lääkäri saattaa pyytää sinua tekemään raskaustestin asian varmistamiseksi.
- M teriflunomidi-hoidon aikana ja sen jälkeen kunnes pitoisuus veressä on matala. Lääkäri sikiöön kohdistuvista riskeistä sekä luotettavan ehkäisymenetelmän tarpeesta.
- Kerro lääkärille jos haluat vaihtaa ehkäisymenetelmää tai suunnittelet raskautta Teriflunomide Mylan -hoidon lopettamisen jälkeen. Keskustele lääkärin kanssa myös jos suunnittelet imetystä tai imetät.
- Jos epäilet raskaana käyttäessäsi Teriflunomide Mylan -valmistetta tai kaksi vuotta lopettamisen jälkeen, sinun pitää ottaa välittömästi yhteys lääkäriin raskaustestin tekemiseksi. Jos testi vahvistaa sinun olevan raskaana, lääkäri saattaa ehdottaa hoitoa tietyillä lääkkeillä, jotka nopeuttavat teriflunomidin poistumista . Tämä voi vähentää sikiöön kohdistuvaa riskiä.
- Tyttöjen vanhempien tai huoltajien tulee olla yhteydessä tytön lääkäriin kun ensimmäiset kuukautiset , jotta tietoa raskaudenaikaisista sikiöön kohdistuvista riskeistä ja ohjeistusta asianmukaisesta ehkäisystä.