

Tämä potilaskortti sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, jotka sinun on tunnettava saadessasi Teriflunomide ratiopharm -hoitoa. Katso pakkausselosteesta täydelliset tiedot.

Yleisiä ohjeita

Näytä kortti kaikille sinua hoitaville lääkäreille tai muille terveydenhuollon ammattilaisille (esimerkiksi kiireellistä hoitoa vaativissa tilanteissa).

Merkittävät haattavaikutukset

Tämä lääke saattaa vaikuttaa maksan toimintaan, verenpaineeseen ja tiettyihin verisoluihin, jotka ovat tärkeitä elimistön puolustautuessa taudinaiheuttajia vastaan.

Jos sinulla ilmenee jokin seuraavista haattavaikutuksista, ota välittömästi yhteys lääkäriin:

- Ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuus, tumma virtsa, pahoinvointi tai oksentelu ja vatsakipu. Nämä saattavat viitata maksasairauteen.
- Korkea lämpö (kuume), yskä, kylmänväreet, turvonneet rauhaset tai vähentynyt tai kivulias virtsan virtaus. Nämä saattavat viitata infektiin.

Haattavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haattavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai hoitohenkilökunnalle. Voit ilmoittaa haattavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).

- Fimea, Lääkkeiden haattavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA, www.fimea.fi tai
- Teva Finland Oy, safety.finland@tevaeu.com, puh. 020 180 5900

Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi, mukaan lukien tytöt ja heidän vanhempansa/ huoltajansa:

- Älä aloita Teriflunomide ratiopharm -hoitoa, jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana. Tämän varmistamiseksi lääkäri saattaa pyytää sinua tekemään raskaustestin.
- Käytä luotettavaa ehkäisymenetelmää Teriflunomide ratiopharm -hoidon aikana ja sen jälkeen. Lääkäri antaa neuvontaa sikiöön mahdollisesti kohdistuvista riskeistä ja tehokkaan ehkäisyn tarpeesta.
- Keskustele lääkärin kanssa, jos haluat vaihtaa ehkäisymenetelmää tai jos haluat tulla raskaaksi.
- Jos tulet raskaaksi tai epäilet olevasi raskaana, lopeta teriflunomidin käyttö ja ota viipymättä yhteys lääkäriin.
- Jos olet raskaana, lääkäri saattaa ehdottaa hoitoa tietyillä lääkkeillä, jotka nopeuttavat teriflunomidin poistumista elimistöstä.
- Keskustele lääkärin kanssa, jos imetät tai aiot imettää lastasi.
- Tyttöjen vanhemmat/huoltajat: ottakaa yhteys lääkäriin, kun potilaan ensimmäiset kuukautiset alkavat, jotta hänelle voidaan antaa neuvontaa sikiöön mahdollisesti kohdistuvista riskeistä ja ehkäisyn tarpeesta.

Potilaan nimi:

Teriflunomide ratiopharm -lääkkeen ensimmäinen määräämispäivä:

Sairaala:

Hoitavan lääkärin nimi:

Hoitavan lääkärin puhelinnumero:

Fimean hyväksymispäivämäärä: 16.5.2025

Versio: Teriflunomide ratiopharm - potilaan opas v02