

Jag tar Lariam®-tabletter (meflokin) för att förebygga malaria:

Namn:

Adress:

Födelsedatum:

Andra läkemedel/sjukdomar:

I nödfall, kontakta:

Läkarens namn:

Läkarens telefonnummer:

Läkarens stämpel:

Kontakta även:

Namn:

Telefonnummer:

Relation:

085223S003



PATIENTKORT

Lariam® 250 mg

(meflokin)

Detta kort innehåller information om eventuella psykiskt relaterade biverkningar av Lariam®-tabletter.

Läs också bipacksedeln som finns i denna förpackning – den ger dig mer detaljerad information om Lariam®-tabletter.

Ha alltid detta kort med dig.

Visa alltid detta kort när du besöker en läkare.

Vad bör jag veta om Lariam®-tabletter?

- Lariam® är ett receptbelagt läkemedel som används för att förebygga och behandla malaria. Malaria är en livshotande infektion. Lariam® är inte verksamt mot alla typer av malaria.
- Ta Lariam®-tabletterna enligt anvisningar från läkaren innan du reser, under din resa och efter din återkomst från malariaområdet.
- Ta inte Lariam®-tabletter om du har, eller någon gång har haft psykiska störningar eftersom Lariam® kan orsaka allvarliga psykiska störningar hos vissa personer så som **själv mord, självmordstankar och självska debeteende.**

Ta inte Lariam®-tabletter om du har, eller någon gång har haft:

- depression, tankar om självmord
- några andra psykiska störningar, så som generaliserat ångestsyndrom,

- schizofreni eller psykos (förlorad kontakt med verkligheten)
- anfall (konvulsioner eller kramper)
 - allergi mot kinin, kinidin, Lariam®-tabletter eller någon av dess hjälpämnen
 - allvarliga leverproblem
 - svartvattenfeber (en komplikation av malaria som påverkar blod och njurar).

Ta inte Lariam®-tabletter om du för närvarande använder ett läkemedel mot malaria som heter halofantrin.

När ska jag kontakta sjukvårdspersonal?

- Vid användning av Lariam®-tabletter är det viktigt att vara medveten om deras eventuella biverkningar. Neuropsykiatriska biverkningar kan uppstå vid användning av Lariam®-tabletter.
- Börja inte använda Lariam®-tabletter om du har risk att utveckla sådana tillstånd. (Se avsnitt **Ta inte Lariam®-tabletter om...**)

Lariam® kan orsaka allvarliga psykiska störningar hos vissa personer. Tala omedelbart om för din läkare om du upplever något av följande när du tar Lariam®-tabletter:

- självmordstankar
- självskadebeteende
- svår ångest
- känslor av misstro mot andra
- syn- eller hörselstörningar
- depression
- rastlöshet
- ovanligt beteende eller

- förvirring
- sömnlöshet
- mardrömmar/onormala drömmar.

Uppsök läkare omedelbart.

Behandlingen med Lariam®-tabletter ska omedelbart avslutas och ersättas med ett annat malarieförebyggande läkemedel.

Andra biverkningar av Lariam®-tabletter kan vara

anfall (konvulsioner eller kramper), leverproblem, hjärtproblem, illamående, kräkningar, diarré, buksmärter, yrsel eller problem med balansen (svindel), huvudvärk, sömnproblem (sömnighet, sömnlöshet, mardrömmar).

Hur du tar Lariam®-tabletter:

- Ta tabletterna en gång i veckan, alltid på samma veckodag.
- Ta den första Lariam®-dosen 10 dagar innan avresa för att säkerställa att Lariam® passar dig.
- Ta en andra dos 3 dagar innan avresa.
- Fortsätt att ta tabletterna under hela din resa och under 4 veckor efter hemkomsten.

När ska jag uppsöka läkare?

- Omedelbart, om du får biverkningar.
- Om du är osäker på ifall du har någon av de listade sjukdomarna (**Ta inte Lariam®-tabletter om...**)
- Om du misstänker att du kan ha någon av de listade psykiskt relaterade biverkningarna (**Lariam® kan orsaka allvarliga psykiska störningar...**)