

- Jos epäilet, että sinulla saattaa olla jokin luettelossa mainittu mielenterveyteen liittyvä haittavaikutus (*Lariam saattaa aiheuttaa joillekin henkilöille vakavia mielenterveyden häiriöitä...*)

Käytän Lariam® (meflokiini) tabletteja malarian estohoitona.

Nimi:

Osoite:

Syntymäaika:

Muut lääkitykset/sairaudet:

Ota hätätapauksessa yhteyttä:

Lääkärin nimi:

Lääkärin puhelinnumero:

Lääkärin leima:

Ota yhteyttä myös:

Nimi:

Puh.:

Sukulaisuussuhde:

085223S002

POTILASKORTTI



Lariam® 250mg

(meflokiini)

Tässä kortissa on tietoa Lariam®-tablettien mahdollisista mielenterveyteen liittyvistä haittavaikutuksista. Lue myös lääkepakkauksen sisältämä pakkauseloste, josta saat tarkempaa tietoa Lariam®-tableteista. Pidä tämä kortti aina mukanas. Näytä tätä korttia aina lääkärin vastaanotolla käydessäsi.

Mitä minun on tiedettävä Lariam®-tableteista?

- Lariam® on reseptilääke, jota käytetään malarian estoon ja hoitoon. Malaria on hengenvaarallinen infektio. Lariam® ei tehoa kaikkiin malariatyyppeihin.
- Ota Lariam®-tabletteja lääkärin antaman ohjeen mukaan ennen kuin matkustat, matkasi aikana sekä malaria-alueelta palattuasi.
- Älä ota Lariam®-tabletteja, jos sinulla on tai on joskus ollut mielenterveyden häiriöitä, koska Lariam® saattaa aiheuttaa joillekin henkilöille vakavia mielenterveyden häiriöitä, kuten **itsemurhan toteuttamisen, itsemurha-ajatuksia ja itsetuhoista käyttäytymistä.**

Älä ota Lariam®-tabletteja, jos sinulla on tai on joskus ollut:

- masennusta, itsemurha-ajatuksia
- muita mielenterveyshäiriöitä, kuten ahdistuneisuushäiriö, skitsofrenia tai

psykoosi (kosketuksen menettäminen todellisuuteen)

- kohtauksia (kouristuskohtauksia tai kouristelua)
- allergia kiniinille, kinidiinille, Lariam[®]-tableteille tai jollekin näiden tablettien apuaineista
- vaikea-asteisia maksan toimintahäiriöitä
- mustavesikuumetta (malarian komplikaatio, joka vaikuttaa vereen ja munuaisiin).

Älä ota Lariam[®]-tabletteja, jos parhaillaan käytät malarialääkettä, jota kutsutaan halofantriiniksi.

Milloin minun on käännättävä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen?

- Lariam[®]-tablettien käytön aikana on tärkeää olla tietoinen niiden mahdollisista haittavaikutuksista. Lariam[®]-tablettien käytön yhteydessä saattaa esiintyä neuropsykiatrisia haittavaikutuksia.
- Älä aloita Lariam[®]-tablettien käyttämistä, jos sinulla on tällaisten tapahtumien kehittymisen riski. (Ks. kohta **Älä ota Lariam[®]-tabletteja, jos**).

Lariam[®] saattaa aiheuttaa joillekin henkilöille vakavia mielenterveyden häiriöitä. Kerro heti lääkärille, jos sinulla esiintyy jotakin seuraavista Lariam[®]-tabletteja käyttäessäsi:

- itsemurha-ajatuksia
- itsetuhoista käyttäytymistä
- voimakasta ahdistuneisuutta
- epäilyksen tunteita muita kohtaan
- näkö- tai kuuloharhoja
- masennusta

- levottomuuden tunnetta
- poikkeavaa käyttäytymistä tai
- sekavuuden tunnetta
- unettomuutta
- poikkeavia unia/painajaisia.

Hakeudu heti lääkäriin.

Lariam[®]-tablettien käyttö on heti lopetettava ja on siirryttävä käyttämään jotakin toista malarian estolääkitystä.

Muita Lariam[®]-tablettien haittavaikutuksia saattavat olla

kohtaukset (kouristuskohtaukset tai kouristelu), maksan toimintahäiriöt, sydämen toimintahäiriöt, pahoinvointi, oksentelu, ripuli, vatsakipu, heitehuimaus tai tasapaino-ongelmat (kiertohuimaus), päänsärky, univaikeudet (unisuus, unettomuus, painajaiset).

Miten Lariam[®]-tabletteja otetaan:

- Ota tabletit kerran viikossa aina samana viikonpäivänä.
- Ota ensimmäinen Lariam[®]-annos 10 päivää ennen matkasi alkamista, jotta voidaan varmistaa, että Lariam[®] sopii sinulle.
- Ota toinen annos 3 päivää ennen matkasi alkamista.
- Jatka tablettien ottamista koko matkasi ajan ja vielä 4 viikon ajan kotiin palattuasi.

Milloin minun on käännättävä lääkärin puoleen?

- Heti, jos sinulle ilmaantuu haittavaikutuksia
- Jos et ole varma, onko sinulla jokin edellä luetelluista sairauksista (*Älä ota Lariam-tabletteja, jos...*)