

Allvarliga infektioner

Även andra allvarliga infektioner kan inträffa vid behandling med TYRUKO. Tala med din läkare så fort som möjligt om du tror att du fått en allvarlig och långvarig infektion, exempelvis långvarig feber.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta inkluderar eventuella biverkningar som inte nämns i bipacksedeln. Du kan också rapportera biverkningar direkt via:

www.fimea.fi eller via post till adressen

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområde Fimea
Läkemedelsbiverkningsregistret
PB 55, 00034 FIMEA.

NR2312123224, 12/2023

Sandoz A/S, www.sandoz.fi
info.suomi@sandoz.com

S A N D O Z

NR2312123224, 12/2023

Godkänt av Fimea 11/2023

PATIENTINFORMATIONSKORT FÖR TYRUKO

Patientens namn: _____

Läkarens namn: _____

Läkarens telefonnummer: _____

Startdatum TYRUKO-behandling: _____

NR2312123224, 12/2023

Godkänt av Fimea 11/2023

TYRUKO[®]
natalizumab

Detta informationskort innehåller viktig säkerhetsinformation som du behöver känna till innan, under och efter avslutad behandling med TYRUKO (natalizumab).

- Visa detta kort för alla behandlande läkare, inte endast neurologen.
- Läs bipacksedeln för TYRUKO innan du påbörjar behandlingen.
- Ha det här kortet med dig under TYRUKO-behandlingen och i sex månader efter den sista TYRUKO-dosen eftersom biverkningar kan uppstå även efter avslutad behandling.
- Visa det här kortet för din partner eller vårdgivare. De kan upptäcka symtom på PML som du själv inte ser, till exempel förändrat humör eller beteende, minnesluckor, tal- och kommunikationssvårigheter. Du bör vara fortsatt uppmärksam på symtom som kan uppstå i upp till 6 månader efter avslutad behandling med TYRUKO.

NR2312123224, 12/2023

Före behandling med TYRUKO

- Du får inte behandlas med TYRUKO om du har allvarliga problem med immunsystemet.
- Du ska inte ta några andra läkemedel för långvarig behandling av multipel skleros medan du får TYRUKO.

Under behandling med TYRUKO

Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)

PML, en sällsynt hjärninfektion, har förekommit hos patienter som fått natalizumab. PML leder ofta till allvarlig funktionsnedsättning eller död.

Risken för PML förefaller öka med behandlingstiden, i synnerhet efter två år.

NR2312123224, 12/2023

Symtomen på PML kan likna ett MS-skov. Om du tror att din MS försämras eller om du upptäcker nya symtom under behandling med TYRUKO eller i upp till 6 månader efter avslutad behandling med TYRUKO är det därför viktigt att du talar med din läkare så fort som möjligt. PML-symtom utvecklas i allmänhet långsammare än symtom för ett MS-skov (inom loppet av dagar eller veckor), men kan likna MS-symtom.

Tecken kan vara:

- förändringar i mental förmåga och koncentration
- beteendeförändringar
- svaghet i ena sidan av kroppen
- synstörningar
- nya neurologiska symtom som du inte känner igen.

Behandling av PML kräver att behandlingen med TYRUKO upphör omedelbart.

NR2312123224, 12/2023