

546752S004 trötthetskänsla, (ihållande) hosta, andfåddhet, influensaliknande symtom, viktninskning, nattliga svettningar, diarré, sår, tandbesvär och sveda vid urinering.

2. Graviditet och vaccinationer

Om du har fått Simponi under din graviditet är det viktigt att du talar om det för ditt barns läkare innan ditt barn får något vaccin. Ditt barn ska inte få ett levande vaccin så som BCG (används för att förhindra tuberkulos) inom 6 månader efter din sista Simponi-injektion under graviditeten.

3. Datum för Simponibehandling

1:a administreringen:

Fortsatta administreringar:

Det är viktigt att du och läkaren noterar varumärke och batchnummer på ditt läkemedel.

4. Övrig information

Patientens namn:

Läkarens namn:

Läkarens telefonnummer:

- Se till att du alltid har en lista med dig på alla övriga läkemedel som du använder när du besöker sjukvården.
- Ha alltid med dig detta kort i 6 månader efter din sista Simponidos, eftersom biverkningar kan uppträda långt efter sista dosen.
- Läs bipacksedeln för Simponi noggrant innan du börjar använda detta läkemedel.

Simponi-potilaskortti

Tämä potilaskortti sisältää tärkeää turvallisuuteen liittyvää tietoa, josta sinun täytyy olla tietoinen ennen Simponi-hoidon aloitusta ja sen aikana.

Näytä tämä kortti kaikille hoitoosi osallistuville lääkäreille.

1. Infektiot

Kun sinua hoidetaan Simponi-valmisteella, saatat saada infektioita herkemmin. Infektiot saattavat edetä nopeammin ja ne voivat olla vaikeampia. Lisäksi jokin aiempi infektio saattaa ilmaantua uudelleen.

1.1. Ennen Simponi-hoitoa

- Kerro lääkärille, jos sinulla on jokin infektio. Sinua ei pidä hoitaa Simponi-valmisteella, jos sinulla on tuberkuloosi tai jokin muu vaikea infektio.
- Sinulle tehdään tuberkuloosin seulontakokeet. On erittäin tärkeää, että kerrot lääkärille, jos sinulla on joskus ollut tuberkuloosi tai jos olet joskus ollut läheisessä kontaktissa henkilön kanssa, jolla on ollut tuberkuloosi. Pyydä lääkäriä merkitsemään viimeisimpien tuberkuloosin seulontatutkimusten tyypit ja päiväykset tähän.:

Tutkimus _____ Tutkimus _____

Päiväys _____ Päiväys _____

Tulos _____ Tulos _____

- Kerro lääkärille, jos tiedät tai epäilet olevasi hepatiitti B -viruksen kantaja.

1.2. Simponi-hoidon aikana ja jälkeen

- Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos sinulle ilmaantuu infektio-oireita, kuten kuumetta, väsymystä, (itsepintaista) yskää, hengenahdistusta tai flunssan kaltaisia oireita, painon alenemista, yöhikoilua, ripulia, haavaumia, hampasongelmia tai kirvelyä virtsatessa.

2. Raskaus ja rokotteet

Jos olet saanut Simponia raskauden aikana, on tärkeää, että kerrot siitä lastasi hoitavalle lääkärille, ennen kuin lapsesi saa mitään rokotuksia.

Lapsellesi ei saa antaa "elävää rokotetta", kuten BCG-rokotetta (käytetään tuberkuloosin ehkäisyyn), 6 kuukauteen raskauden aikana saamasi viimeisen Simponi-injektion jälkeen.

3. Simponi-hoidon päivämäärät

1. annos:

Seuraavat annokset:

On tärkeää, että sinä ja lääkärisi kirjaatte lääkevalmisteesi kaupanimen ja eränumeron.

4. Muuta tietoa

Potilaan nimi:

Lääkärin nimi:

Lääkärin puh.:

- Varmista, että sinulla on mukana luettelo kaikista muista käyttämistäsi lääkkeistä aina, kun menet vastaanotolle.
- Pidä tämä kortti mukanasasi 6 kuukauden ajan viimeisen Simponi-annoksen jälkeen, sillä haittavaikutuksia voi ilmaantua pitkänkin ajan kuluttua viimeisestä Simponi-annoksesta.
- Lue Simponin pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen.

Simponi Patientkort

Detta patientkort innehåller viktig säkerhetsinformation som du behöver känna till innan och under behandling med Simponi.

Visa detta kort vid varje tillfälle som du besöker läkare.

1. Infektioner

Du kan lättare få infektioner när du behandlas med Simponi. Infektioner kan utvecklas snabbare och vara allvarligare. Dessutom kan tidigare infektioner återkomma.

1.1 Före Simponibehandling:

- Tala om för läkaren om du har en infektion. Du får inte behandlas med Simponi om du har tuberkulos (TBC) eller någon annan allvarlig infektion.
- Läkaren kommer att undersöka om du har tuberkulos. Det är mycket viktigt att du talar om för läkaren om du någonsin har haft tuberkulos eller om du har varit i nära kontakt med någon som har haft tuberkulos. Be läkaren att notera typ och datum för senaste tuberkulosundersökning(ar) nedan.

Undersökning

Undersökning

Datum

Datum

Resultat

Resultat

- Tala om för läkaren om du vet eller misstänker att du är bärare av hepatit B-virus.

1.2 Under och efter Simponibehandling

- Uppsök omedelbart läkarvård om du har tecken på en infektion. Sådana tecken omfattar feber,