

On tärkeää, että ilmoitat Opsumit-hoidon aikana ilmenneestä raskaudesta tai haittavaikutuksesta heti lääkettä määränneelle lääkärille.

Det är viktigt att du omedelbart rapporterar graviditet eller eventuella biverkningar som inträffar under behandling med Opsumit till din förskrivande läkare.

Hoitopaikka/Vårdinrättning:

Läkettä määränneen lääkärin nimi /
Namn på förskrivande läkare:

Läkettä määränneen lääkärin puhelinnumero /
Telefonnummer till förskrivande läkare:

Muiden tämän luokan lääkkeiden tavoin Opsumit voi vaikuttaa maksaan. Lääkäri otattaa ennen Opsumit-hoidon aloittamista ja hoidon aikana verikokeita, joilla tutkitaan maksan toimintaa.

Liksom andra läkemedel i denna grupp kan Opsumit påverka levern. Din läkare kommer att ta blodprover innan du påbörjar behandlingen med Opsumit och under behandlingen, för att kontrollera om din leverfunktion är normal.

Keuhkovaltimoiden verenpainetaudin (pulmonaaliarteriahypertensio) hoitoon

Tämä kortti sisältää tärkeää turvallisuustietoa Opsumit-hoidosta. Pidä kortti aina mukana ja näytä se kaikille sinua hoitaville lääkäreille.

Opsumit® 10 mg
masitentaani
kalvopäällysteinen tabletti

För behandling av pulmonell arteriell
hypertension

Det här kortet innehåller viktig säkerhetsinformation som du behöver känna till när du behandlas med Opsumit. Bär alltid med dig det här kortet och visa det för alla läkare som är involverade i din vård.

Opsumit® 10 mg
macitentan
filmdragerade tabletter

Raskaus

Opsumit voi vaikuttaa haitallisesti sikiön kehitykseen. Tästä syystä Opsumitia ei saa ottaa raskauden aikana etkä saa tulla raskaaksi Opsumit-hoidon aikana. Jos sinulla on keuhkovaltimoiden verenpainetauti, raskaus voi pahentaa taudin oireita vaikeasti.

Ehkäisy

Opsumit-hoidon aikana on käytettävä luotettavaa raskauden ehkäisymenetelmää.

Jos sinulla on kysyttävää, keskustele asiasta lääkärin kanssa.

Sinun on tehtävä raskaustesti ennen Opsumit-hoidon aloittamista ja joka kuukausi hoidon aikana, vaikka et epäilisiäkään olevasi raskaana.

Graviditet

Opsumit kan skada utvecklingen av fostret. Därför ska du inte ta Opsumit om du är gravid och du ska heller inte bli gravid medan du tar Opsumit. Dessutom, om du har pulmonell arteriell hypertension (høgt blodtryck i lungorna), kan en graviditet allvarligt försämra dina sjukdomssymtom.

Preventivmedel

Du måste använda ett tillförlitligt preventivmedel medan du tar Opsumit. Tala med din läkare om du har frågor om detta.

Du måste göra ett graviditetstest innan du börjar ta Opsumit och varje månad under behandlingen, även om du inte tror att du är gravid.

Maksan toimintahäiriön oireita voivat olla mm:

- pahoinvointi (oksettava olo)
- oksentelu
- kuume
- vatsakipu
- ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuus
- virtsan tummuus
- ihon kutina
- poikkeuksellinen väsymys tai uupumus
- flunssankaltaiset oireet (nivel- ja lihaskipu ja kuume)

Jos sinulla on jokin näistä oireista, ilmoita asiasta heti lääkärille. Jos sinulla on kysyttävää hoidostasi, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Tecken på att din lever kanske inte fungerar normalt kan vara:

- Illamående (önskan att kråkas)
- kräkningar
- feber (hög temperatur)
- mag-/buksmärta
- gulstot (gulfärgning av hud och ögonvitor)
- mörkfärgad urin
- kliande hud
- dvalliknande tillstånd eller trötthet (ovanlig trötthet eller utmattning)
- influensaliknande symtom (led- och muskelsmärter med feber)

Om du märker något av dessa tecken ska du omedelbart tala om detta för din läkare. Om du har frågor om din behandling, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.