

Patientkort

Patient [Namn/Personnummer]

Läkaren som ordinerat Tepkinly (namn)

Den behandlande läkarens telefonnummer (under kontorstid)

Den behandlande läkarens telefonnummer vid akutvård (utanför kontorstid)

Närståendes kontaktinformation vid nödsituation

Datomet för första Tepkinly-dosen

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55, 00034 FIMEA
www.fimea.fi

AbbVie Oy
tel. 010 2411 200
www.abbvie.fi

Version: Juli 2023
FI-EPCOR-230003/RMP/03.06.2024

abbvie

Du ska alltid ha med dig detta patientkort. Visa det för all hälso- och sjukvårdspersonal som medverkar i din vård och vid alla sjukhusbesök.

Tala om att du behandlas med Tepkinly® (epkoritamab) för all hälso- och sjukvårdspersonal som medverkar i din vård.

Om du får några som helst biverkningar under eller efter behandling med Tepkinly, tala med läkare eller sjuksköterska.

Var försiktig när du kör bil, cyklar eller använder tunga eller potentiellt farliga maskiner. Undvik dessa aktiviteter om du har något av de symtom som beskrivs i detta kort.



Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Fimea eller till ombudet för innehavaren av godkännande för försäljning (AbbVie Oy).

Information för patienter

Tepkinly kan orsaka biverkningar, som kan vara allvarliga.

Ring din läkare eller uppsök omedelbart akutsjukvård om du har något av följande symtom:

- Feber (38 °C eller högre)
- Yrsel eller svindel
- Frossa
- Snabb puls
- Andningssvårigheter/
andfåddhet
- Huvudvärk
- Svårighet att tala eller skriva
- Dåsighet
- Förvirring/desorientering
- Muskelsvaghet
- Krampanfall
- Minnesförlust

Information för hälso- och sjukvårdspersonal

- Denna patient behandlas med Tepkinly (epkoritamab). Epkoritamab är en T-cellsaktiverande bispecifik antikropp.
- Efter behandling med epkoritamab kan cytokinfrisättningssyndrom (CRS) och immuneffektorcells-associerat neurotoxicitetsyndrom (ICANS) förekomma. Dessa tillstånd kan vara allvarliga om de inte behandlas omedelbart. CRS kan uppkomma flera timmar eller dagar efter att epkoritamab har administrerats, oftast efter den första fulla dosen i cykel 1. ICANS kan uppkomma flera dagar eller veckor efter administrering av epkoritamab.
- **Kontakta omedelbart patientens behandlande läkare för ytterligare information (kontaktuppgifter finns på kortets baksida).**

Ytterligare information

Läs bipacksedeln för ytterligare information. Du får även tillgång till bipacksedeln genom att skanna den nedanstående QR-koden, som leder till webbplatsen tepkinly.eu.

En digital version av patientkortet finns också tillgänglig på webbplatsen tepkinly.eu.

