

ELREXFIO[®]-potilaskortti (elranatamabi)



Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa

HAITTAVAIKUTUKSISTA ILMOITTAMINEN

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, sairaanhoitajalle tai apteekkihenkilökunnalle. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen Fimeaan

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

tai

Pfizer Oy:n puhelinvaihteen (09-430 040) kautta.

Pidä tämä kortti aina mukanasasi. **NÄYTÄ KORTTI** kaikille hoitoosi osallistuville terveydenhuollon ammattilaisille ja mahdollisten päivystyskäyntien yhteydessä.

TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA ELREXFIO-HOITOA SAAVALLE POTILAALLE

Ota yhteyttä terveydenhuoltoyksikköosi tai hakeudu heti päivystykseen, jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista oireista:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Kuume (38 °C tai enemmän)• Hengitysvaikeudet• Vilunväristykset• Päänsärky• Matala verenpaine• Huimaus• Nopea sydämen syke• Veren maksaentsyymiarvojen suureneminen | <ul style="list-style-type: none">• Sekavuus• Heikentynyt vireystila• Puheen tuottamisen tai kirjoittamisen vaikeudet• Tunnottomuus ja pistely tai tuntoaistimusten häviäminen |
|---|---|

Kysy aina lääkäriltäsi neuvoa ennen kuin käytät muita lääkkeitä ELREXFIO-hoidon aikana.

TÄRKEÄÄ MUISTAA: Sinua voidaan pyytää pysyttelemään terveydenhuoltoyksikön läheisyydessä, jotta terveydenhuollon ammattilainen voi seurata vointiasi päivittäin oireiden ja löydösten varalta **48 tuntia kahden ensimmäisen nostovaiheen annoksen jälkeen**. Jos sinulla ilmenee mikä tahansa näistä oireista, ota yhteyttä lääkäriin tai hakeudu päivystykseen välittömästi. Luettelossa ei ole mainittu kaikkia mahdollisia oireita, joita ELREXFIO voi aiheuttaa. Kerro lääkärillesi, jos sinulla on jokin oire, joka vaivaa sinua eikä mene ohi.

TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA TERVEYDEN- HUOLLON AMMATTILAISELLE

ELREXFIO-hoito voi aiheuttaa sytokiinioireyhtymän tai neurologista toksisuutta, mukaan lukien ICANS-oireyhtymän, mikä voi olla henkeä uhkaava ja pahimmillaan johtaa kuolemaan. Sytokiinioireyhtymä voi vaikuttaa useisiin elinjärjestelmiin.

Potilasta hoidetaan ELREXFIO-valmisteella.

ELREXFIO-hoidosta vastaava lääkäri (hematologi):

Hoitopaikan puh. nro: _____

Puh. nro toimistoajan jälkeen: _____

Terveystoimiston nimi: _____

ELREXFIO-injektion antopäivämäärä:

- 1. nostovaiheen annos: _____
- 2. nostovaiheen annos: _____
- Ensimmäinen ylläpitoannos: _____



Fimean hyväksyntä: 16.11.2023

Versio: 1.0

PP-E1A-FIN-0002-15122023