

Potilaskortti

Rivaroxaban Krka 2,5 mg ☐
Rivaroxaban Krka 10 mg ☐
Rivaroxaban Krka 15 mg ☐
Rivaroxaban Krka 20 mg ☐



(merkitse potilaalle määrätty annos rastittamalla ruutu)

620661



- ♦ Pidä tämä kortti aina mukanas
- ♦ Näytä tämä kortti aina lääkärille tai hammaslääkärille ennen hoitotoimenpiteitä

Tietoa terveydenhuollon ammattilaiselle:

- ♦ INR-mittausta ei tule käyttää, koska se ei kuvaa Rivaroxaban Krka -valmisteen antikoagulanttivaikutusta luotettavasti.



Mitä minun tulisi tietää Rivaroxaban Krka -valmisteesta?

- ♦ Rivaroxaban Krka ohentaa verta ja estää siten vaarallisten veritulppien muodostumisen.
- ♦ Ota Rivaroxaban Krka -valmistetta juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Parhaan suojan veritulppia vastaan saat, **kun otat sinulle**

määrätyt annokset säännöllisesti.

- ♦ Älä lopeta Rivaroxaban Krka -valmisteen ottamista keskustelematta ensin lääkärin kanssa, sillä lopettaminen saattaa lisätä veritulpan riskiä.
- ♦ Ennen kuin aloitat ottamaan Rivaroxaban Krka -valmistetta, kerro lääkärille kaikista muista lääkevalmisteista, joita parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai aiot alkaa ottaa.
- ♦ Kerro aina että käytät Rivaroxaban Krka -valmistetta ennen kuin sinulle tehdään kirurginen tai muu toimenpide.

Milloin tarvitsen lääkärin apua?

- Rivaroxaban Krka -valmisteen kaltaista verenohennuslääkettä käytettäessä on tärkeää olla tietoinen sen mahdollisista haittavaikutuksista. Yleisin haittavaikutus on verenvuoto. Jos tiedät, että sinulla on verenvuotoriski, älä ala käyttää Rivaroxaban Krka -valmistetta keskustelematta asiasta ensin lääkärin kanssa. Kerro välittömästi lääkärille, jos sinulla ilmenee jotain seuraavista verenvuodon merkeistä tai oireista:
- ♦ kipua

- ♦ turvotusta tai epämukavuutta
- ♦ päänsärkyä, huimausta tai heikotusta
- ♦ epänormaalia mustelmien muodostumista, nenä- tai ienverenvuotoa tai jos verenvuodon tyrehtyminen kestää poikkeuksellisen kauan
- ♦ tavallista runsaampaa kuukautisvuotoa tai muuta verenvuotoa emättimestä
- ♦ virtsassasi on verta ja se voi olla vaaleanpunaista tai ruskeaa taikka ulosteesi ovat punaisia tai mustia
- ♦ yskit verta taikka oksennat verta tai kahvinporoja muistuttavia hiukkasia

Miten otan Rivaroxaban Krka -valmistetta?

- ♦ Parhaan suojan saamiseksi Rivaroxaban Krka
 - 2,5 mg voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman
 - 10 mg voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman
 - 15 mg tulee ottaa ruoan kanssa
 - 20 mg tulee ottaa ruoan kanssa

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden

haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA

sekä myyntiluvanhaltijan paikallinen edustaja:

KRKA Finland Oy, pharmacovigilance.fi@krka.biz, puh. 020 754 5330

Versio: 1.0, Fimean hyväksymispäivämäärä: 27.1.2025

Käytän verenohennuslääkettä, joka on Rivaroxaban Krka (rivaroksabaani)

Nimi:

Osoite:

Syntymäaika:

Paino:

Muut lääkkeet/sairaudet:

Hätätapauksissa ilmoittakaa:

Lääkärin nimi:

Lääkärin leima:

Lääkärin puhelin:

Ilmoittakaa myös:

Nimi:

Puhelin:

Suhde potilaaseen: