

POTILASKORTTI

Potilaskortti toimitetaan potilaalle erillisenä korttina, joka on pakkauksen sisällä yhdessä pakkausselosteen kanssa.

Topimax®

Potilaskortti Topimax-valmistetta varten – Naisille ja tytöille, jotka voivat tulla raskaaksi.

Raskauden ehkäisy.

Mitä sinun on tiedettävä

- Topimax on lääke, joka on tarkoitettu epilepsian ja migreenin hoitoon.
- Topimax voi vahingoittaa vakavasti syntymätöntä lasta, jos sitä käytetään raskauden aikana.

Mitä sinun on tehtävä

- Lue pakkausseloste ja potilasohje huolellisesti ennen käyttöä.
- Käytä erittäin tehokasta ehkäisyä topiramaattihoidon aikana ja vähintään 4 viikon ajan viimeisen topiramaattiannoksen jälkeen. Lääkäri neuvoo sinulle sopivimman menetelmän.
- Käy lääkärillä tarkistamassa hoitosi vähintään kerran vuodessa.
- Jos epäilet tulleesi raskaaksi, ota heti yhteyttä lääkäriin.
- Jos harkitset lapsen hankkimista, älä lopeta ehkäisyä ennen kuin olet keskustellut lääkärin kanssa.
- Jos sinulla on epilepsia, älä lopeta topiramaatin käyttöä, ellei lääkäri niin määrää, sillä tilasi voi pahentua.

Pyydä lääkäriltä potilasopas.

Säilytä tämä kortti.

PARANOVA

017304S001

PATIENTKORT

Patientkortet medföljer som ett separat kort tillsammans med bipacksedeln i förpackningen.

Topimax®

Patientkort för Topimax –

För kvinnor och flickor som kan bli gravida. Preventivmedel och att förhindra graviditet.

Vad du behöver veta

- Topimax är ett läkemedel för behandling av epilepsi och migrän.
- Topimax kan allvarligt skada ett ofött barn om det tas under graviditeten.

Vad du måste göra

- Läs bipacksedeln och patientguiden noga före användning.
- Använd högeffektiva preventivmedel under behandlingen med topiramid och i minst 4 veckor efter den sista topiramid-dosen. Läkaren ger dig råd om vilka preventivmedel som är mest lämpliga för dig.
- Träffa läkare och se över behandlingen minst en gång om året.
- Om du tror att du har blivit gravid, kontakta omedelbart läkare.
- Om du planerar att skaffa barn ska du inte sluta använda preventivmedel innan du har talat med läkare.
- Om du har epilepsi, sluta inte ta detta läkemedel om inte läkaren har sagt att du ska göra det, eftersom din sjukdom i så fall kan förvärras.

Efterfråga patientguiden av läkaren.

Spara det här patientkortet.

PARANOVA