

POTILASKORTTI

- ☐ Rivaroxaban Sandoz® 2,5 mg
- ☐ Rivaroxaban Sandoz® 10 mg
- ☐ Rivaroxaban Sandoz® 15 mg
- ☐ Rivaroxaban Sandoz® 20 mg

(merkitse potilaalle määrätty annos rastittamalla ruutu)

- Pidä tämä kortti aina mukanas
- Näytä tämä kortti aina lääkärille tai hammaslääkärille ennen hoitotoimenpiteitä

Käytän verenohennuslääkettä, joka on Rivaroxaban Sandoz (rivaroksabaani).

Nimi _____

Osoite _____

Syntymäaika _____

Paino _____

Muut lääkkeet/sairaudet _____

Hätätapauksissa ilmoittakaa:

Lääkäri nimi: _____

Lääkäri puhelin: _____

Lääkäri leima: _____

Ilmoittakaa myös:

Nimi: _____

Puhelin: _____

Suhde potilaaseen: _____

Tietoa terveydenhuollon ammattilaiselle:

- INR-mittausta ei tule käyttää, koska se ei kuvaa Rivaroxaban Sandoz -valmisteen antikoagulanttivaikutusta luotettavasti.

Mitä minun tulisi tietää Rivaroxaban Sandoz -valmisteesta?

- Rivaroxaban Sandoz ohentaa verta ja estää siten vaarallisten veritulppien muodostumisen.

- Ota Rivaroxaban Sandoz -valmistetta juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Parhaan suojan veritulppia vastaan saat, kun otat sinulle määrätty annokset säännöllisesti.
- Älä lopeta Rivaroxaban Sandoz -valmisteen ottamista keskustelematta ensin lääkärin kanssa, sillä lopettaminen saattaa lisätä veritulpan riskiä.
- Ennen kuin aloitat ottamaan Rivaroxaban Sandoz -valmistetta, kerro lääkärille kaikista muista lääkevalmisteista, joita parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai aiot alkaa ottaa.

- Kerro aina että käytät Rivaroxaban Sandoz -valmistetta ennen kuin sinulle tehdään kirurginen tai muu toimenpide.

Milloin tarvitsen lääkärin apua?

Rivaroxaban Sandoz -valmisteen kaltaista verenohennuslääkettä käytettäessä on tärkeää olla tietoinen sen mahdollisista haittavaikutuksista. Yleisin haittavaikutus on verenvuoto. Jos tiedät, että sinulla on verenvuotoriski, älä ala käyttää Rivaroxaban Sandoz -valmistetta keskustelematta asiasta ensin lääkärin kanssa. Kerro välittömästi lääkärille, jos sinulla ilmenee jotain seuraavista verenvuodon merkeistä tai oireista:

- kipua
- turvotusta tai epämukavuutta
- päänsärkyä, huimausta tai heikotusta
- epänormaalia mustelmien muodostumista, nenä- tai ienverenvuotoa tai jos verenvuodon tyrehtyminen kestää poikkeuksellisen kauan
- tavallista runsaampaa kuukautisvuotoa tai muuta verenvuotoa emättimestä
- virtsassasi on verta ja se voi olla vaaleanpunaista tai ruskeaa taikka ulosteesi ovat punaisia tai mustia

- yskit verta taikka oksennat verta tai kahvinporoja muistuttavia hiukkasia.

Miten otan Rivaroxaban Sandoz -valmistetta?

- Parhaan suojan saamiseksi Rivaroxaban Sandoz
 - 2,5 mg voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman
 - 10 mg voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman
 - 15 mg tulee ottaa ruoan kanssa
 - 20 mg tulee ottaa ruoan kanssa

PATIENTKORT

- ☐ Rivaroxaban Sandoz® 2,5 mg
- ☐ Rivaroxaban Sandoz® 10 mg
- ☐ Rivaroxaban Sandoz® 15 mg
- ☐ Rivaroxaban Sandoz® 20 mg

(kryssruta för ikryssning av förskriven dos)

- Bär alltid detta kort med dig
- Ta fram kortet varje gång du söker behandling hos läkare eller tandläkare

Jag får antikoagulationsbehandling med Rivaroxaban Sandoz (rivaroxaban).

Namn: _____

Adress: _____

Födelsedatum: _____

Vikt: _____

Andra läkemedel / medicinska tillstånd: _____

I akuta situationer, vänligen kontakta:

Läkarens namn: _____

Läkarens telefonnummer: _____

Läkarens stämpel: _____

Vänligen kontakta också:

Namn: _____

Telefonnummer: _____

Relation: _____

Information för vårdpersonal:

- INR-test ska inte användas eftersom det inte är ett tillförlitligt mått på den antikoagulatoriska aktiviteten hos Rivaroxaban Sandoz.

Vad bör jag veta om Rivaroxaban Sandoz?

- Rivaroxaban Sandoz gör blodet tunnare, vilket förhindrar bildning av farliga blodproppar.

- Rivaroxaban Sandoz måste tas exakt så som din läkare ordinerat. För att få ett optimalt skydd mot blodproppar ska du **aldrig hoppa över en dos**.
- Du ska inte sluta ta Rivaroxaban Sandoz utan att först tala med din läkare, eftersom risken för blodproppar kan öka.
- Tala om för din vårdpersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, innan du påbörjar behandling med Rivaroxaban Sandoz.
- Tala om för din vårdpersonal att du tar Rivroxaban Sandoz innan kirurgi eller andra ingrepp.

När ska jag be om råd från min läkare?

När man tar blodförtunnande medel som Rivaroxabam Sandoz är det viktigt att känna till eventuella biverkningar. Blödningar är den vanligaste biverkningen. Påbörja inte behandling med Rivaroxaban Sandoz om du vet att du har risk för blödningar, utan att först diskutera detta med din läkare. Tala genast om för din läkare om du har fått några tecken eller symtom på blödning enligt nedan:

- smärta
- svullnad eller obehag

- huvudvärk, yrsel eller svaghet
- ovanligt många blåmärken, näsblödning, blödningar från tandköttet eller från sår som tar lång tid att sluta blöda
- menstruation eller vaginal blödning som är kraftigare än normalt
- blod i urinen som kan vara rosa- eller brunfärgad, röd eller svart avföring
- upphostningar med blod, eller kräkningar med blod eller kaffesumpsliknande kräkningar.

Hur ska jag ta Rivaroxaban Sandoz?

- För att få ett optimalt skydd, ska Rivaroxaban Sandoz
 - 2,5 mg tas med eller utan mat
 - 10 mg tas med eller utan mat
 - 15 mg tas med mat
 - 20 mg tas med mat