

Patientkort

Bär med dig detta kort vid alla tillfällen

Visa detta kort på apoteket, hos tandläkaren och för all annan sjukvårdspersonal som behandlar dig.

Jag behandlas med Apixaban ratiopharm GmbH (apixaban) ett antikoagulantium för att förhindra blodproppar

Vänligen fyll i detta avsnitt eller be din läkare fylla i

Namn: _____

Födelsedatum: _____

Indikation: _____

Dos: _____ mg två gånger dagligen

Läkarens namn: _____

Läkarens telefonnummer: _____

Information till patienten

- Ta Apixaban ratiopharm GmbH regelbundet enligt instruktionerna. Om du missar en morgondos, ska du ta eller ge den så snart du kommer på det, och den kan tas eller ges tillsammans med kvälldosen. En missad kvälldos kan bara tas eller ges under samma kväll. Ta eller ge inte två doser nästa morgon, utan fortsätt att följa doseringsschemat två gånger dagligen enligt rekommendationen dagen därpå.
- Sluta inte ta Apixaban ratiopharm GmbH utan att rådfråga din läkare, eftersom du riskerar att få en stroke eller andra komplikationer.
- Apixaban ratiopharm GmbH hjälper till att förtunna blodet. Emellertid kan detta öka risken för blödning.
- Tecken och symtom på blödning kan vara blåmärken eller blödning under huden, svartfärgad avföring, blod i urinen, näsblod, yrsel, trötthet, blekhet eller svaghet, plötslig svår huvudvärk, att man hostar blod eller kräks blod.
- Om blödningen inte slutar av sig själv, sök medicinsk vård omedelbart.
- Om du är i behov av kirurgi eller invasiva ingrepp ska du tala om för läkaren att du använder Apixaban ratiopharm GmbH.

Information till vårdpersonal

- Apixaban ratiopharm GmbH (apixaban) är ett oralt antikoagulantium som verkar genom att direkt selektivt hämma faktor Xa.
- Apixaban ratiopharm GmbH kan öka risken för blödning. Om en större blödning inträffar ska apixabanbehandlingen omedelbart avbrytas.
- Behandling med Apixaban ratiopharm GmbH kräver inte rutinmässig koncentrationsmätning. Ett kalibrerat kvantitativt anti-faktor Xa test kan vara till hjälp under exceptionella omständigheter, t.e.x vid överdosering och akut kirurgi (protrombintid (PT), internationellt normaliserat ratio (INR) och aktiverad partiell tromboplastintid (aPTT) koaguleringsstest rekommenderas inte) - se Produktresumé.
- Ett läkemedel för reversering av anti-faktor Xa-aktiviteten finns tillgängligt, men dess säkerhet och effekt har inte fastställts hos pediatrika patienter (se produktresumén för Andexanet alfa).