

Potilaskortti

Pidä tämä kortti aina mukana

Näytä tämä kortti apteekkihenkilökunnalle, hammaslääkärille tai muulle sinua hoitavalle terveydenhuollon ammattilaiselle.

Saan verenhytytymistä estävää Apixaban ratiopharm GmbH -hoitoa (apiksabaani) verisuonitukosten estämiseksi

Ole hyvä ja täytä tämä osio itse tai pyydä lääkäriäsi tekemään se

Nimi: _____

Syntymäaika: _____

Käyttöaihe: _____

Annos: _____ mg kahdesti vuorokaudessa

Lääkärin nimi: _____

Lääkärin puhelinnumero: _____

Tietoa potilaille

- Ota Apixaban ratiopharm GmbH säännöllisesti ohjeiden mukaan. Jos unohdat aamuannoksen, ota se heti kun muistat. Se voidaan ottaa yhdessä ilta-annoksen kanssa. Unohtuneen ilta-annoksen saa ottaa vain samana iltana. Älä ota seuraavana aamuna kahta annosta, vaan jatka seuraavana päivänä hoitoa suositellun tavanomaisen aikataulun mukaan kahdesti vuorokaudessa.
- Älä lopeta Apixaban ratiopharm GmbH-lääkkeen käyttöä keskustelematta ensin lääkärisi kanssa, sillä sinulla on riski saada aivohalvaus tai muita komplikaatioita.
- Apixaban ratiopharm GmbH auttaa ohentamaan verta. Tämä voi kuitenkin suurentaa verenvuotoriskiä.
- Verenvuodon merkkeihin ja oireisiin kuuluvat mustelmat tai ihonalainen verenvuoto, mustaksi värjäytyvä uloste, verinen virtsa, nenäverenvuoto, huimaus, väsymys, kalpeus tai heikotus, äkillinen vaikea päänsärky, veriyskä tai verioksennus.
- Jos verenvuoto ei lopu itsestään, hakeudu heti hoitoon.
- Jos tarvitset leikkaushoitoa tai sinulle pitää tehdä mikä tahansa kajoava toimenpide, kerro lääkärillesi, että käytät Apixaban ratiopharm GmbH-lääkettä.

Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

- Apixaban ratiopharm GmbH (apiksabaani) on suun kautta otettava antikoagulantti, joka vaikuttaa estämällä suoraan ja selektiivisesti hyttymistekijä Xa:ta.
- Apixaban ratiopharm GmbH saattaa suurentaa verenvuotoriskiä. Jos verenvuoto on voimakasta, lääkkeen käyttö on lopetettava välittömästi.
- Lääkeainepitoisuuksia elimistössä ei tarvitse mitata rutiinimaisesti Apixaban ratiopharm GmbH -hoidon aikana. Poikkeustilanteissa, esimerkiksi yliannostuksen ja hätäleikkauksen yhteydessä, anti-FXa määrittämisestä kalibroidulla kvantitatiivisella testillä voi olla hyötyä. Näitä ei suositella: protrombiini-aika (PT), international normalised ratio (INR) ja aktivoitu partiaalinen tromboplastiini-aika (aPTT) - katso valmisteyhteenveto.
- Apiksabaanin anti-FXa-aktiivisuuden vaikutuksen kumoamiseksi on saatavilla lääkeaine, mutta sen turvallisuutta ja tehoa pediatriassa potilailla ei ole varmistettu (ks. andeksaneetti alfan valmisteyhteenveto).