

PATIENTKORT**Patientkort**

Accord

Rivaroxaban Accord 2,5 mg ☐

Rivaroxaban Accord 10 mg ☐

Rivaroxaban Accord 15 mg ☐

Rivaroxaban Accord 20 mg ☐

♦ Bär alltid detta kort med dig

♦ Ta fram kortet varje gång du söker behandling hos läkare eller tandläkare

Jag får antikoagulationsbehandling med Rivaroxaban Accord (rivaroxaban).

Namn:

Adress:

Födelsedatum:

Vikt:

Andra läkemedel / medicinska tillstånd:

I akuta situationer, vänligen kontakta:

Läkarens namn:

Läkarens telefonnummer:

Läkarens stämpel:

Vänligen kontakta också:

Namn:

Telefonnummer:

Relation:

Information för vårdgivare:

♦ INR-test ska inte användas eftersom det inte är ett tillförlitligt mått på den antikoagulatoriska aktiviteten hos Rivaroxaban Accord.

Vad bör jag veta om Rivaroxaban Accord?

♦ Rivaroxaban Accord gör blodet tunnare, vilket förhindrar bildning av farliga blodproppar.

♦ Rivaroxaban Accord måste tas exakt så som din läkare ordinerat. För att få ett optimalt skydd mot blodproppar **ska du aldrig hoppa över en dos.**

♦ Du ska inte sluta ta Rivaroxaban Accord utan att först tala med din läkare, eftersom risken för blodproppar kan öka.

♦ Tala om för din vårdgivare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, innan du påbörjar behandling med Rivaroxaban Accord.

♦ Tala om för din vårdgivare att du tar Rivaroxaban Accord innan kirurgi eller andra ingrepp.

När ska jag be om råd från min läkare?

När man tar blodförtunnande medel som Rivaroxaban Accord är det viktigt att känna till eventuella biverkningar. Blödningar är den vanligaste biverkningen. Påbörja inte behandling med Rivaroxaban Accord om du vet att du har risk för blödningar, utan att först diskutera detta med din läkare. Tala genast om för din läkare om du har fått några tecken eller symtom på blödning enligt nedan:

- ◆ smärta
- ◆ svullnad eller obehag
- ◆ huvudvärk, yrsel eller svaghet
- ◆ ovanligt många blåmärken, näsblödning, blödningar från tandköttet eller från sår som tar lång tid att sluta blöda
- ◆ menstruation eller vaginal blödning som är kraftigare än normalt
- ◆ blod i urinen som kan vara rosa- eller brunfärgad, röd eller svart avföring
- ◆ upphostningar med blod, eller kräkningar med blod eller kaffesumpsliknande kräkningar.

Hur ska jag ta Rivaroxaban Accord?

- ◆ För att få ett optimalt skydd, ska Rivaroxaban Accord
 - 2,5 mg tas med eller utan mat
 - 10 mg tas med eller utan mat
 - 15 mg tas med mat
 - 20 mg tas med mat.