

Potilaskortti

Sivu 1

Keuhkovaltimoiden verenpainetaudin hoitoon. Tässä kortissa on tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja, joista sinun on oltava tietoinen Yuvanci-hoitoa saadessasi. Pidä tämä kortti aina mukanas ja näytä sitä kaikille hoitoosi osallistuville lääkäreille. Yuvanci® 10 mg/20 mg Yuvanci® 10 mg/40 mg masitentaani/tadalafiili kalvopäällysteiset tabletit FI	On tärkeää, että ilmoitat lääkkeen määränneelle lääkärille välittömästi, jos tulet raskaaksi, sekä kaikista Yuvanci-hoidon aikana mahdollisesti ilmenevistä haittavaikutuksista. Hoitoyksikkö: Lääkkeen määränneen lääkärin nimi: Lääkkeen määränneen lääkärin puhelinnumero:
---	--

Sivu 2

Sivu 3

Raskaus Yuvanci voi haitata sikiön kehitystä. Siksi et saa käyttää Yuvanci-valmistetta, jos olet raskaana. Et myöskään saa tulla raskaaksi Yuvanci-hoidon aikana. Lisäksi jos sairastat keuhkovaltimoiden verenpainetauti, raskaus voi pahentaa sairautesi oireita vaikea-asteisesti.	Ehkäisy Sinun on käytettävä Yuvanci-hoidon aikana luotettavaa ehkäisyä. Jos sinulla on kysyttävää, käännä lääkärin puoleen. Sinun pitää tehdä raskaustesti ennen Yuvanci-hoidon aloittamista ja joka kuukausi hoidon aikana, vaikka et omasta mielestäsi olisikaan raskaana.
--	--

Sivu 4

Sivu 5

Yuvanci voi muiden samaan lääkeryhmään kuuluvien lääkkeiden tavoin vaikuttaa maksaan. Lääkäri ottaa verikokeen ennen Yuvanci-hoidon aloittamista sekä hoidon aikana selvittääkseen, toimiiko maksasi kunnolla. Mahdollisia merkkejä siitä, että maksasi ei toimi kunnolla, ovat • pahoinvointi • oksentelu • kuume • mahakipu (vatsakipu) • keltaisuus (ihon ja silmänvalkuaisten muuttuminen keltaiseksi) • tumma virtsa • ihon kutina • apaattisuus tai uupumus (poikkeava väsymys tai voimattomuus) • flunssan kaltainen oireyhtymä (nivel- ja lihaskipu, johon liittyy kuumetta).	Jos havaitset näitä oireita, kerro siitä välittömästi lääkärille. Jos sinulla on kysyttävää hoidostasi, käännä lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
---	--

Sivu 6