

PAC - Patient alert card

Dimension: 237x70 mm (folded dimension 30x70 mm)

FRONT SIDE

[illegible]

BACK SIDE

PATIENTKORT		Apixaban Sandoz® (apixaban)		SE	
Detta kort ska alltid finnas med dig, barnet eller vårdnadshavaren. Visa detta kort på apoteket, hos tandläkaren och för all annan sjukvårdspersonal före behandling. Log för blodförtunnande behandling med Apixaban Sandoz för att förhindra blodproppar. Vänligen fyll i detta avsnitt eller be din läkare göra det.					
Namn: _____ Födelsedatum: _____ Indikation: _____ Vikt: _____ Dos: _____ mg två gånger om dagen Läkarens namn: _____ Läkarens telefonnummer: _____					
Information till patienter/vårdnadshavare: • Ta/ge Apixaban Sandoz regelbundet enligt instruktionerna. Om du missar en morgondos, ta/ge den så snart du kommer ihåg och den kan tas ges tillsammans med kvällsdosen. En missad kvällsdos kan bara tas ges under samma kväll. Ta/ge inte två doser nästa morgon, utan fortsätt följa ditt doseringsschema två gånger dagligen enligt rekommendationen dagen därpå. • Slut inte ta/ge Apixaban Sandoz utan att rådfråga läkaren, eftersom du/patienten riskerar att få en stroke, blodpropp eller andra komplikationer.					
• Apixaban Sandoz hjälper till att för tunn blodet. Detta kan emellertid öka risken för blödning. • Tecken och symptom på blödning kan vara blåmärken eller blödning under huden, svart (blått/grönt) avföring, blod i urinen, näsblod, yrsel, trötthet, blekhet eller svaghet, plötslig svår huvudvärk, att man hostar blod eller kräks blod. • Om blödningen inte slutar av sig själv, sök medicinsk vård omedelbart.					
• Om du/patienten är i behov av kirurgi eller invasiva ingrepp ska du tala om för läkaren att du/patienten använder Apixaban Sandoz. Information till hälso- och sjukvårdspersonal • Apixaban Sandoz är ett oralt antikoagulantium som verkar genom att direkt och selektivt hämma faktorn Xa. • Apixaban Sandoz kan öka risken för blödning. Om en större blödning inträffar ska apixabanbehandlingens omedelbart avbrytas.					
• Behandling med Apixaban Sandoz kräver inte rutinmässiga kontroller av exponeringen. Ett kalibrerat, kvalitativt anti-faktor Xa-test kan vara till nytta i undantagsfall, t.ex. vid överdosering och akut kirurgi (koagulationstesterna protrombintid [PT], internationellt normaliserad kvot [INR] och aktiverad partiell tromboplastintid [aPTT] rekommenderas inte) – se produktresumen. • Ett läkemedel för reversering av apixabans anti-faktor Xa-aktiviteten finns tillgängligt för vuxna, men dess säkerhet och effekt har inte fastställts hos pediatriska patienter (se produktresumen för andexamet alfo).					

GMD/SKU No.:		Mock-up name:		MOCK-UP	
N/A		(FI)-01-PAC_BO_Apixaban SDZ 2025-10-31			
Artwork Department Nordics		Artwork creator: Ute Wilhelm		Creation date: 31-OCT-2025	
Proof No.: 2					
Artwork Order No.: N/A		AW identifier No. New: N/A		AW identifier No. Old: N/A	
Artwork Order description: N/A					
Packaging site: N/A					
Dimension: 237x70 (30x70) mm		Printing colours: ■ PANTONE 541 C		Technical colours: ■ Cutting ■ TextArea ■ Guides	
Tech. Drawing No.: XXXX					
Live text: ☒ Yes ☐ No ☐ Both					
Condensed font: ☐ Yes ☒ No					
Font type: Futura					
		Print enhancements:			
Minimum font size body text: 7 pt					
Variable data prefixes font size: N/A					
Braille:					
! PLEASE TURN OVERPRINTING ON !					