

# Cimzia® Potilaskortti

**Pidä tämä kortti aina mukanas ja näytä sitä aina käydessäsi lääkärin vastaanotolla.**

## Infektiot

CIMZIA® suurentaa infektioriskiä. Infektiot saattavat edetä tavallista nopeammin ja olla tavallista vaikea-asteisempia. Tämä koskee myös tuberkuloosia, jota esiintyy lähinnä keuhkoissa (keuhkotuberkuloosi). Joissain tapauksissa tuberkuloosia voi esiintyä jossain muussa elimessä (keuhkojen ulkopuolinen tuberkuloosi) tai useammassa kuin yhdessä elimessä samanaikaisesti (yleistynyt tuberkuloosi).

### Ennen kuin saat CIMZIA®-hoitoa:

- Sinulle ei saa antaa CIMZIA®-hoitoa, jos sinulla on vakava infektio.
- Sinulle on tehtävä seulontatutkimus mahdollisen hepatiitti B -infektion toteamiseksi. Jos olet hepatiitti B:n kantaja, aktiivisen hepatiitti B -infektion merkkejä ja löydöksiä tulee seurata tarkasti. CIMZIA®-hoito tulee lopettaa potilailla, joille kehityy aktiivinen hepatiitti B -infektio.
- Sinulle on tehtävä tuberkuloosin seulontatutkimus. On erittäin tärkeää, että kerrot lääkärille, jos sinulla on joskus ollut tuberkuloosi tai jos olet ollut sellaisen henkilön läheisyydessä, joka on sairastanut tuberkuloosin.

Kirjaa seuraavaan kohtaan sinulle viimeksi tehtyjen tuberkuloosin seulontatutkimusten päivämäärät:

Tuberkuliinikoe/IGRA: \_\_\_\_\_

Keuhkokuva: \_\_\_\_\_

### CIMZIA®-hoidon aikana:

- Jos sinulle kehittyi infektioon viittaavia oireita, kuten kuumetta, pitkittynyttä yskää, painon laskua tai väsymystä, hakeudu heti lääkärin hoitoon.

## Sydämen vajaatoiminta

### Ennen CIMZIA®-hoitoa:

- Lääkärin on oltava varovainen sydämen vajaatoimintaa sairastavan potilaan hoidossa. Sinulle ei saa antaa CIMZIA®-hoitoa, jos sinulla on keskivaikea tai vaikea sydämen vajaatoiminta.

### CIMZIA®-hoidon aikana:

- Jos sinulle kehittyi sydämen vajaatoimintaan viittaavia oireita (esim. hengästyneisyyttä tai jalkaterien turpoamista), hakeudu heti lääkärin hoitoon.

## Allergiset reaktiot

Jos sinulle ilmaantuu allergisia reaktioita, kuten puristuksen tunnetta rinnassa, hengityksen vinkumista, heitehuimausta, turvotusta tai ihottumaa, lopeta Cimzia®-valmisteen käyttö ja ota heti yhteyttä lääkäriin. Osa näistä reaktioista saattaa ilmaantua ensimmäisen Cimzia®-injektion jälkeen.

### Potilaiden rokottaminen:

- CIMZIA®-hoidon aikana ei potilaalle tule antaa eläviä eikä heikennettyjä taudinaiheuttajia sisältäviä rokotteita.

### Potilaille tehtävät kirurgiset toimenpiteet:

- Jos potilaalle on tehtävä leikkaus CIMZIA®-hoidon aikana, infektioiden mahdollista ilmaantumista on seurattava tarkoin ja ryhdyttävä tarvittaessa asianmukaisiin toimenpiteisiin.

### Syöä

- Syöpäriski voi olla suurentunut potilailla, joilla on jokin vaikea tulehduksellinen pitkäaikaissairaus, kuten nivelreuma. Myös TNF:n estäjähoito saattaa suurentaa syöpäriskiä. Nivelreumaa koskeneissa tutkimuksissa syöpiä raportoitiin kuitenkin suurin piirtein yhtä monella CIMZIA®-hoitoa saaneella potilaalla kuin vertailuryhmän potilailla, jotka eivät saaneet CIMZIA®-hoitoa.

## Vaikutukset laboratorikokeisiin

Kerro lääkärillesi, jos saat verenohennuslääkitystä tai jos sinulle tehdään veren hyytymistutkimuksia.

CIMZIA®-hoitoa saaneilla potilailla on havaittu häiriöitä tietyissä veren hyytymiskokeissa (koagulaatiokokeissa). CIMZIA® saattaa aiheuttaa virheellisen pidentyneeseen hyytymisaikaan viittaavan testituloksen, vaikka potilaalla ei olisi tällaista. Tällaisia vaikutuksia on havaittu Diagnostica Stagon PTT-LA- ja STA-PTT A -testien käytön yhteydessä sekä Instrumentation Laboratoriesin HemosIL APTT-SP liquid -testin ja HemosIL APTT lyophilised silica -testin käytön yhteydessä. Valmiste saattaa vaikuttaa myös muihin aPTT-testeihin. Valmisteen ei ole havaittu vaikuttavan trombiinajan (TT) ja protrombiinajan (PT) testeihin. Siitä ei ole näyttöä, että CIMZIA®-hoito vaikuttaisi veren hyytymiseen (koagulaatioon *in vivo*).

Kaikkien tässä kortissa mainitulle potilaalle lääkkeitä määräävien tulee perehtyä CIMZIA®n valmisteyhteenvetoon.

## CIMZIA®-hoidon päivämäärät:

1. pistos: \_\_\_\_\_

Seuraavat pistokset: \_\_\_\_\_

Potilaan nimi: \_\_\_\_\_

Lääkärin nimi: \_\_\_\_\_

Lääkärin puhelinnumero: \_\_\_\_\_

- Ks. lisätietoja pakkausselosteesta.
- Varmista, että sinulla on aina mukanas myös luettelo kaikista muista käyttämistäsi lääkkeistä, kun käyt terveydenhoitohenkilöstön vastaanotolla.

Pidä tämä kortti mukanas viiden kuukauden ajan viimeisestä CIMZIA®-annoksesta, koska haittavaikutuksia voi ilmaantua vielä pitkän ajan kuluttua viimeisen CIMZIA®-annoksen jälkeen.

### Suorajakelijan riskienminimointimateriaalin hyväksymispäivämäärä 12.5.2017

Paranova Oy, Rajatorpantie 41 C, 01640 Vantaa, Tel. (09) 4391 850, info@paranova.fi