

POTILASKORTTI

Sislaf (apiksabaani)

Potilaskortti

Pidä tämä kortti aina mukanas!

Näytä tämä kortti apteekkihenkilökunnalle, hammaslääkärille tai muulle sinua hoitavalle terveydenhuollon ammattilaiselle.

Saan verenhyytymistä estävää Sislaf-hoitoa (apiksabaani) verisuonitukosten estämiseksi

Ole hyvä ja täytä tämä osio itse tai pyydä lääkäriäsi tekemään se

Nimi:

Syntymäaika:

Käyttöaihe:

Annos: mg kahdesti vuorokaudessa

Lääkärin nimi:

Lääkärin puhelinnumero:

Tietoa potilaille

- Ota Sislaf säännöllisesti ohjeiden mukaan. Jos unohdat annoksen, ota se heti kun muistat ja jatka sitten hoitoa tavanomaisen aikataulun mukaan.
- Älä lopeta Sislaf-lääkkeen käyttöä keskustelematta ensin lääkärisi kanssa, sillä sinulla on riski saada aivohalvaus tai muita komplikaatioita.
- Sislaf auttaa ohentamaan verta. Tämä voi kuitenkin suurentaa verenvuotoriskiäsi.
- Verenvuodon merkkeihin ja oireisiin kuuluvat mustelmat tai ihonalainen verenvuoto, mustaksi värjäytyvä uloste, verinen virtsa, nenäverenvuoto, huimaus, väsymys, kalpeus tai heikotus, äkillinen vaikea päänsärky, veriyskä tai verioksentus.
- Jos verenvuoto ei lopu itsestään, **hakeudu heti hoitoon.**
- Jos tarvitset leikkaushoitoa tai sinulle pitää tehdä mikä tahansa kajoava toimenpide, kerro lääkärillesi, että käytät Sislaf-lääkettä.

Syyskuu 2024

Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

- Sislaf (apiksabaani) on suun kautta otettava antikoagulantti, joka vaikuttaa estämällä suoraan ja selektiivisesti hyytymistekijä Xa:ta.
- Sislaf saattaa suurentaa verenvuotoriskiä. Jos verenvuoto on voimakasta, lääkkeen käyttö on lopetettava välittömästi.
- Lääkeainepitoisuuksia elimistössä ei tarvitse mitata rutiinimaisesti Sislaf-hoidon aikana. Poikkeustilanteissa, esimerkiksi yliannostuksen ja hätäleikkauksen yhteydessä, antifaktori Xa -määrityksestä kalibroidulla kvantitatiivisella testillä voi olla hyötyä. Näitä ei suositella: protrombiiniaika (PT), international normalised ratio (INR) ja aktivoitu partiaallinen tromboplastiiniaika (aPTT) – katso valmisteyhteenveto.
- Apiksabaanin antifaktori Xa -aktiivisuuden vaikutuksen kumoamiseksi on saatavilla lääkeaine.