

PATIENTINFORMATIONSKORT [Dabigatran etexilate Glenmark 75 mg / 110 mg / 150 mg kapslar]

Dabigatran etexilate Glenmark
dabigatranetexilat

- Du/vårdaren ska alltid ha med detta patientinformationskort.
- Se till att det är den senaste versionen

Februari 2024, Glenmark Arzneimittel GmbH

Bästa patient/vårdare av en pediatrik patient

Du/ditt barn har nu börjat behandlas med Dabigatran etexilate Glenmark (dabigatranetexilat). För att kunna använda Dabigatran etexilate Glenmark på ett säkert sätt bör du läsa den viktiga informationen i bipacksedeln.

Detta informationskort innehåller viktig information om din/ditt barns behandling. Se därför till att du/ditt barn alltid har med det. Informera vårdpersonal om att du/ditt barn använder Dabigatran etexilate Glenmark.

Information om Dabigatran etexilate Glenmark för patienter/vårdare av pediatrika patienter

Om din/ditt barns behandling

- Dabigatran etexilate Glenmark tunnar ut blodet. Det används för att behandla befintliga blodproppar eller förhindra att farliga blodproppar bildas.
- Följ din/ditt barns läkares anvisningar när du tar Dabigatran etexilate Glenmark. Hoppa aldrig över en dos och sluta inte ta/ge Dabigatran etexilate Glenmark utan att först prata med din/ditt barns läkare.
- Informera din/ditt barns läkare om alla läkemedel som du/ditt barn tar.
- Informera läkaren om att du/ditt barn tar Dabigatran etexilate Glenmark innan du/ditt barn ska genomgå en operation eller andra ingrepp.
- Dabigatran etexilate Glenmark kapslar kan tas med eller utan mat. Kapseln ska sväljas hel med ett glas vatten. Kapseln får inte brytas sönder eller tuggas och kornen får inte tömmas ut från kapseln.

När du bör uppsöka läkare

- Blödningsrisken kan öka när du tar Dabigatran etexilate Glenmark. Kontakta genast läkare om du/ditt barn upplever tecken och symtom på blödning såsom svullnad, obehag, ovanlig smärta eller huvudvärk, yrsel, blekhet, svaghet, ovanliga blåmärken, näsblod, blödning i tandköttet, ovanligt långvarig blödning vid skärsår, onormalt mensflöde eller blödning från slidan, blod i urinen som kan vara rosa eller brun, röd/svart avföring, blodiga upphostningar, blodiga kräkningar eller kräkningar som liknar kaffesump.
- Vid fall eller skada, framför allt om huvudet skadas, kontakta genast läkare.
- Sluta inte att ta Dabigatran etexilate Glenmark utan att först prata med din/ditt barns läkare, om du/ditt barn upplever halsbränna, illamående, kräkningar, magbesvär, uppsvälld mage eller smärta i övre delen av buken.

Information om Dabigatran etexilate Glenmark för vårdpersonal

- Dabigatran etexilate Glenmark är ett oralt antikoagulantium (direkt trombinhämmare).
- Behandlingen med Dabigatran etexilate Glenmark kan behöva avbrytas inför en operation eller annat ingrepp.
- Om större blödningshändelser uppstår måste behandlingen med Dabigatran etexilate Glenmark avbrytas omedelbart.
- Ett specifikt reverserande läkemedel (idarucizumab) finns tillgängligt för vuxna patienter.

Effekt och säkerhet för det specifika reverserande läkemedlet, idarucizumab, har inte fastställts hos pediatriiska patienter. För mer information och ytterligare råd om hur den antikoagulerande effekten av Dabigatran etexilate Glenmark kan motverkas, se produktresumén för Dabigatran etexilate Glenmark och idarucizumab.

- Dabigatran etexilate Glenmark utsöndras huvudsakligen via njurarna; adekvat diures måste upprätthållas. Dabigatran etexilate Glenmark kan dialyseras.

Fyll i denna del eller be din/ditt barns läkare att göra det

Patientinformation

Patientens namn

Födelsedatum

Indikation för antikoagulation

Dos av Dabigatran etexilate Glenmark