

POTILASKORTTI [Dabigatran etexilate Glenmark 75 mg / 110 mg / 150 mg kapseleille]

Dabigatran etexilate Glenmark dabigatraanieteksilaatti

- Tämän kortin on oltava aina potilaan tai potilasta hoitavan henkilön mukana
- Varmista, että käytössäsi on viimeisin versio

Helmikuu 2024, Glenmark Arzneimittel GmbH

Hyvä potilas / lapsipotilasta hoitava henkilö,

lääkärisi / lastasi hoitava lääkäri on aloittanut sinulle/lapsellesi Dabigatran etexilate Glenmark (dabigatraanieteksilaatti) -hoidon. Tutustu pakkausselosteessa oleviin tärkeisiin ohjeisiin Dabigatran etexilate Glenmark -kapselien turvallisen käytön varmistamiseksi.

Tämä potilaskortti sisältää tärkeää tietoa lääkehoidostasi / lapsesi lääkehoidosta. Pidä sitä aina mukanasasi / lapsesi mukana, jotta terveydenhuollon ammattilaiset tietävät sinun/lapsesi käyttävän Dabigatran etexilate Glenmark -kapseleita.

Dabigatran etexilate Glenmark -tietoa potilaille / lapsipotilaita hoitaville henkilöille

Tietoa lääkehoidostasi / lapsesi lääkehoidosta

- Dabigatran etexilate Glenmark ohentaa verta. Sitä käytetään veritulppien hoitoon tai ehkäisemään vaarallisten veritulppien muodostumista.
- Seuraa lääkärisi / lastasi hoitavan lääkärin ohjeita, kun käytät Dabigatran etexilate Glenmark -kapseleita. Älä koskaan jätä annoksia ottamatta tai lopeta Dabigatran etexilate Glenmark -kapselien käyttöä keskustelematta lääkärisi / lastasi hoitavan lääkärin kanssa.
- Kerro lääkärillesi / lastasi hoitavalle lääkärille kaikista lääkkeistä, joita parhaillaan käytät / joita lapsesi parhaillaan käyttää.
- Kerro lääkärillesi / lastasi hoitavalle lääkärille Dabigatran etexilate Glenmark -kapselien käytöstä ennen mitään kirurgisia tai elimistön sisälle ulottuvia toimenpiteitä.
- Dabigatran etexilate Glenmark -kapselit voidaan ottaa ruoan kanssa tai tyhjään mahaan. Kapseli on nieltävä kokonaisena vesilasillisen kera. Kapselia ei saa murtaa tai pureskella, eikä pellettejä saa ottaa pois kapselin sisältä.

Milloin on syytä hakeutua lääkäriin

- Dabigatran etexilate Glenmark -kapselien käyttö voi suurentaa verenvuotoriskiä. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin / lastasi hoitavaan lääkäriin, jos havaitset itselläsi/lapsellasi seuraavia mahdollisia verenvuodon merkkejä ja oireita: turvotus, epämukava olo, epätavallinen kipu tai päänsärky, huimaus, kalpeus, heikotus, epätavallinen mustelmien muodostus, verenvuoto nenästä, verenvuoto ikenistä, epätavallisen pitkään kestävä verenvuoto haavoista, poikkeava kuukautisvuoto tai verenvuoto emättimestä, veren esiintyminen virtsassa, mikä värjää virtsan vaaleanpunaiseksi tai ruskeaksi, punertavat/mustat ulosteet, veren yskiminen, verta sisältävä tai kahvinpuruja muistuttava oksennus.
- Kaatumisen tai loukkaantumisen yhteydessä, varsinkin jos lyöt pääsi tai lapsesi lyö päänsä. Ota kiireellisesti yhteyttä lääkäriin.
- Älä lopeta Dabigatran etexilate Glenmark -kapselien käyttöä keskustelematta lääkärisi / lastasi hoitavan lääkärin kanssa, jos sinulla/lapsellasi esiintyy närästystä, pahoinvointia, oksentelua, vatsavaivoja, vatsan turvotusta tai ylävatsakipuja.

Dabigatran etexilate Glenmark -tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

- Dabigatran etexilate Glenmark on suun kautta otettava antikoagulantti (suora trombiinin estäjä).
- Dabigatran etexilate Glenmark -valmisteen käyttö on ehkä keskeytettävä ennen kirurgisia tai invasiivisia toimenpiteitä.
- Dabigatran etexilate Glenmark -valmisteen käyttö on lopetettava välittömästi, jos esiintyy merkittävää verenvuotoa.
- Spesifinen vastalääke (idarusitsumabi) on saatavilla aikuispotilaille. Spesifisen vastalääkkeen, idarusitsumabin, tehoa ja turvallisuutta pediatriksille potilaille ei ole varmistettu. Tarkempia tietoja ja lisäohjeita Dabigatran etexilate Glenmark -valmisteen antikoagulaatiovaikutuksen kumoamisesta, ks. Dabigatran etexilate Glenmark -valmisteen ja idarusitsumabin valmisteyhteenvedot.
- Dabigatran etexilate Glenmark eliminoiduu pääasiassa munuaisten kautta; riittävää diureesia on ylläpidettävä. Dabigatran etexilate Glenmark on dialysoitavissa.

Täytä tämä osio tai pyydä lääkäriäsi / lastasi hoitavaa lääkäriä täyttämään se.

Potilastiedot

Potilaan nimi

Syntymäaika

Käyttöaihe

Dabigatran etexilate Glenmark –annostus