

POTILASKORTTI

Potilaskortti

Glenmark Pharmaceuticals Nordic AB

Rivaxa 2,5 mg (merkitse potilaalle määrätty annos rastittamalla ruutu)

Rivaxa 10 mg (merkitse potilaalle määrätty annos rastittamalla ruutu)

Rivaxa 15 mg (merkitse potilaalle määrätty annos rastittamalla ruutu)

Rivaxa 20 mg (merkitse potilaalle määrätty annos rastittamalla ruutu)

- **Pidä tämä kortti aina mukanas.**
- **Näytä tämä kortti aina lääkärille tai hammaslääkärille ennen hoitoa.**

Saan hoitoa Rivaxa-tableteilla (rivaroksabaani), jotka estävät veren hyytymistä

Nimi:

Osoite:

Syntymäaika:

Paino:

Muut lääkitykset / sairaudet:

Yhteystiedot hätätilanteita varten:

Lääkärin nimi:

Lääkärin puhelinnumero:

Lääkärin leima:

Yhteyttä otettava lisäksi seuraavaan henkilöön:

Nimi:

Puhelinnumero:

Sukulaisuussuhde/yhteys:

Tiedot terveydenhuollon ammattilaisille:

- INR-arvoa ei pidä käyttää, sillä se ei ole Rivaxa-valmisteen antikoagulanttivaikutuksesta riippuvainen mittari.

Mitä minun on tiedettävä Rivaxa-valmisteesta?

- Rivaxa ohentaa verta ja estää siten vaarallisia veritulppia.
- Rivaxa-tabletit on otettava juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Varmistaaksesi parhaan mahdollisen suojan veritulpilta, **älä koskaan jätä annosta ottamatta.**
- Et saa lopettaa Rivaxa-tablettien ottamista keskustelematta ensin lääkärin kanssa, sillä veritulppien riski voi lisääntyä.
- Kerro ennen Rivaxa-hoidon aloittamista sinua hoitavalle terveydenhuollon ammattilaiselle kaikista lääkkeistä, joita parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai joiden käytön aiot aloittaa.
- Kerro sinua hoitavalle terveydenhuollon ammattilaiselle ennen leikkausta tai kajoavaa (invasiivista) toimenpidettä, että käytät Rivaxa-tabletteja.

Milloin minun pitää kysyä neuvoa minua hoitavalta terveydenhuollon ammattilaiselta?

Verenhennuslääkkeitä, kuten Rivaxa-valmistetta, otettaessa on tärkeää olla tietoinen lääkkeen mahdollisista haittavaikutuksista. Yleisin haittavaikutus on verenvuoto. Jos tiedät, että sinulla on verenvuotoriski, älä aloita Rivaxa-tablettien käyttämistä keskustelematta ensin lääkärin kanssa. Kerro heti sinua hoitavalle terveydenhuollon ammattilaiselle, jos sinulla on verenvuodon oireita tai merkkejä, kuten

- kipua
- turvotusta tai epämukavuuden tunnetta
- päänsärkyä, huimausta tai heikotusta
- epätavallisia mustelmia, nenäverenvuotoa, verenvuotoa ikenistä, haavojen verenvuodon tyrehtymisen kestämistä pitkään

- tavanomaista runsaammat kuukautiset tai tavanomaista runsaampi emätinverenvuoto
- verta virtsassa, minkä seurauksena virtsa voi olla vaaleanpunaista tai ruskeaa, punaisia tai mustia ulosteita
- veren yskimistä tai veren oksentamista tai kahvinporoilta näyttäviä oksennuksia.

Miten otan Rivaxa-tabletteja?

- Parhaan mahdollisen suojan varmistamiseksi Rivaxa-annos
 - 2,5 mg voidaan ottaa ruokailun yhteydessä tai tyhjään mahaan
 - 10 mg voidaan ottaa ruokailun yhteydessä tai tyhjään mahaan
 - 15 mg on otettava ruokailun yhteydessä
 - 20 mg on otettava ruokailun yhteydessä.