

PATIENTKORT

Rivaroxaban ratiopharm 2,5 mg



Rivaroxaban ratiopharm 10 mg



Rivaroxaban ratiopharm 15 mg



Rivaroxaban ratiopharm 20 mg



Bär alltid detta kort med dig

Ta fram kortet varje gång du söker behandling hos läkare eller tandläkare

Jag får antikoagulationsbehandling med Rivaroxaban ratiopharm (rivaroxaban)

Namn: _____

I akuta situationer, vänligen kontakta:

Adress: _____

Läkarens namn: _____

Födelsedatum: _____

Läkarens telefonnummer: _____

Vikt: _____

Andra läkemedel/medicinska tillstånd:

Vänligen kontakta också:

Namn: _____

Telefonnummer: _____

Relation: _____

Information för vårdgivare:

- INR-test ska inte användas eftersom det inte är ett tillförlitligt mått på den antikoagulatoriska aktiviteten hos Rivaroxaban ratiopharm.

Vad bör jag veta om Rivaroxaban ratiopharm?

- Rivaroxaban ratiopharm gör blodet tunnare, vilket förhindrar bildning av farliga blodproppar.
- Rivaroxaban ratiopharm måste tas exakt så som din läkare ordinerat. För att få ett optimalt skydd mot blodproppar **ska du aldrig hoppa över en dos.**
- Du ska inte sluta ta Rivaroxaban ratiopharm utan att först tala med din läkare, eftersom risken för blodproppar kan öka.
- Tala om för din vårdpersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, innan du påbörjar behandling med Rivaroxaban ratiopharm
- Tala om för din vårdpersonal att du tar Rivaroxaban ratiopharm innan kirurgi eller andra ingrepp.

När ska jag be om råd från min läkare?

När man tar blodförtunnande medel som Rivaroxaban ratiopharm är det viktigt att känna till eventuella biverkningar. Blödningar är den vanligaste biverkningen. Påbörja inte behandling med Rivaroxaban ratiopharm om du vet att du har risk för blödningar, utan att först diskutera detta med din läkare. Tala genast om för din läkare om du har fått några tecken eller symtom på blödning enligt nedan:

- smärta
- svullnad eller obehag
- huvudvärk, yrsel eller svaghet
- ovanligt många blåmärken, näsblödning, blödningar från tandköttet eller från sår som tar lång tid att sluta blöda

- menstruation eller vaginal blödning som är kraftigare än normalt
- blod i urinen som kan vara rosa- eller brunfärgad, röd eller svart avföring
- upphostningar med blod, eller kräkningar med blod eller kaffesumpsliknande kräkningar.

Hur ska jag ta Rivaroxaban ratiopharm?

För att få ett optimalt skydd, ska Rivaroxaban ratiopharm

- 2,5 mg tas med eller utan mat
- 10 mg tas med eller utan mat
- 15 mg tas med mat
- 20 mg tas med mat

ratiopharm