

POTILASKORTTI

Rivaroxaban ratiopharm 2,5 mg ☐
Rivaroxaban ratiopharm 10 mg ☐
Rivaroxaban ratiopharm 15 mg ☐
Rivaroxaban ratiopharm 20 mg ☐

Pidä tämä kortti aina mukanas!

Näytä tämä kortti aina lääkärille tai hammaslääkärille ennen hoitotoimenpiteitä

Käytän verenohennuslääkettä, joka on Rivaroxaban ratiopharm (rivaroksabaani)

Nimi: _____

Hätätapauksissa ilmoittakaa:

Osoite: _____

Lääkärin nimi: _____

Syntymäaika: _____

Lääkärin puh: _____

Paino: _____

Muut lääkkeet/sairaudet:

Ilmoittakaa myös:

Nimi: _____

Puh: _____

Suhde potilaaseen: _____

Tietoa terveydenhuollon ammattilaiselle:

- INR-mittaus ei tule käyttää, koska se ei kuvaa Rivaroxaban ratiopharm -valmisteen antikoagulanttivaikutusta luotettavasti.

Mitä minun tulisi tietää Rivaroxaban ratiopharm -valmisteen?

- Rivaroxaban ratiopharm ohentaa verta ja estää siten vaarallisten veritulppien muodostumisen.
- Ota Rivaroxaban ratiopharm -valmistetta juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Parhaan suojan veritulppia vastaan saat, **kun otat sinulle määrätty annokset säännöllisesti.**
- Älä lopeta Rivaroxaban ratiopharm -valmisteen ottamista keskustelematta ensin lääkärin kanssa, sillä lopettaminen saattaa lisätä veritulpan riskiä.
- Ennen kuin aloitat ottamaan Rivaroxaban ratiopharm -valmistetta, kerro lääkärille kaikista muista lääkevalmisteista, joita parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai aiot alkaa ottaa.
- Kerro aina että käytät Rivaroxaban ratiopharm -valmistetta ennen kuin sinulle tehdään kirurginen tai muu toimenpide.

Milloin tarvitsen lääkärin apua?

Rivaroxaban ratiopharm -valmisteen kaltaista verenohennuslääkettä käytettäessä on tärkeää olla tietoinen sen mahdollisista haittavaikutuksista. Yleisin haittavaikutus on verenvuoto. Jos tiedät, että sinulla on verenvuotoriski, älä ala käyttää Rivaroxaban ratiopharm -valmistetta keskustelematta asiasta ensin lääkärin kanssa. Kerro välittömästi lääkärille, jos sinulla ilmenee jotain seuraavista verenvuodon merkeistä tai oireista.

- kipua
- turvotusta tai epämukavuutta
- päänsärkyä, huimausta tai heikotusta
- epänormaalia mustelmien muodostumista, nenä- tai ienverenvuotoa tai jos verenvuodon tyrehtyminen kestää poikkeuksellisen kauan
- tavallista runsaampaa kuukautisvuotoa tai muuta verenvuotoa emättimestä
- virtsassasi on verta ja se voi olla vaaleanpunaista tai ruskeaa taikka ulosteesi ovat punaisia tai mustia
- yskit verta taikka oksennat verta tai kahvinporoja muistuttavia hiukkasia

Miten otat Rivaroxaban ratiopharm -valmistetta?

Parhaan suojan saamiseksi Rivaroxaban ratiopharm

- 2,5 mg voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman
- 10 mg voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman
- 15 mg tulee ottaa ruoan kanssa
- 20 mg tulee ottaa ruoan kanssa

ratiopharm