

Bästa föräldrar, vårdgivare

Syftet med detta brev är att hjälpa och ge support för att förstå ditt barns sjukdom och de potentiella riskerna med behandling med Attadex tabletter.

Vad är ADHD?

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) är en psykiatrisk störning hos barn, ungdomar och vuxna. Som namnet antyder så inkluderar symtomen på denna störning problem med uppmärksamhet och koncentration, liksom impulsivitet och hyperaktivitet. Barnet behöver inte ha alla allvarliga symtom, men överlag är symtomen mer allvarliga och vanliga än hos majoriteten av barn i samma ålder. Diagnosen ställs under övervakning av en person med specialistkompetens i Barn- och ungdomspsykiatri efter en noggrann utvärdering av barnets symtom och bakgrund genom att använda DSM-kriterier eller riktlinjerna enligt ICD.

Hur behandlas ADHD?

Behandlingen av ADHD består av flera delar. Det första steget är information om sjukdomen och dess orsaker, liksom att ge möjlighet till förståelse för behandlingar genom att ge information och råd till patienten och hans/hennes föräldrar eller andra vårdgivare. I det andra steget ges utbildning till barnet och hans/hennes familj och ibland ges utbildning också till lärare och annan omsorgspersonal.

De läkemedel som används är centralstimulantia (som dexamfetamin) och icke-centralstimulantia. Användning av centralstimulantia sker enligt specifika krav och kraven övervakas av nationella myndigheter. Det är därför viktigt att användning av centralstimulantia sker noggrant och på rätt sätt.

Vad ska övervägas när ett barn får behandling med centralstimulantia?

Behandling med centralstimulantia får endast inledas och ske under överinseende av läkare med specialistkompetens i Barn- och ungdomspsykiatri eller Barn- och Ungdomsmedicin. Liksom för alla receptbelagda läkemedel så är det viktigt med korrekt användning av centralstimulantia, de ska användas med försiktighet. Centralstimulantia kan ge biverkningar om det inte används korrekt; användning av höga doser eller användning utan kontakt med läkare kan ge allvarliga hälsoproblem.

Dexamfetamin kan ge upphov till missbruk och beroende om det används på fel sätt. Medicinen ska inte säljas vidare eller ges till andra.

Försäljning till andra innebär att centralstimulantia används av någon annan än den som fått medicinen utskrivet. Vidareförsäljning kan resultera i allvarliga straff för användaren.

Hur ska Attadex tabletter tas?

- Ta alltid läkemedlet enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.
- Ta läkemedlet tillsammans med vätska tex. vatten, helst tillsammans med eller omedelbart efter en måltid.

- Attadex tas en eller två gånger dagligen. Den sista dosen för dagen ska inte tas för sent efter lunch för att undvika sömnsvärigheter.
- Felaktig dosering av Attadex kan orsaka onormalt beteende. Det kan också betyda att ditt barn kan utveckla ett beroende av läkemedlet. Tala om för läkaren om ditt barn någon gång har missbrukat eller varit beroende av alkohol, receptbelagda läkemedel eller narkotika.
- Kontakta läkare om ditt barn fått i sig för stor mängd läkemedel.
- Om ditt barn plötsligt slutar att ta det här läkemedlet, kan detta leda till extrem trötthet, depression, humörsvängningar, häftig oro, sömnstörningar, ökad aptit eller ofrivilliga rörelser. Prata med läkaren innan ditt barn avbryter behandlingen med Attadex.

Hur kan användning av Attadex påverka symptomen?

Vissa symptom kan tyda på felaktig användning eller överanvändning av centralstimulantia, men symptomen behöver inte tyda på missbruk. En del symptom kan vara biverkningar av behandlingen. Sådana symptom inkluderar: upprymdhet, trötthet, hyperaktivitet, ilska, oro, förlängd vakenhet utan att äta, kraftig viktnedgång liksom vidgade pupiller och mun- och nästorrhet. Kontakta din barns läkare om du är bekymrad över ditt barns symptom.

Vad kan jag göra?

- Se till att ditt barn tar rätt dos. Du behöver veta när receptet förnyas, när och hur ofta ditt barn tar medicinen.
- Se till att medicinen förvaras på en säker plats.
- Berätta för ditt barn om riskerna och farorna med att använda centralstimulantia.
- Ha en öppen atmosfär så att barnet känner sig tryggt och vill prata om sina problem och bekymmer.

Läs bipacksedeln för ytterligare information.