

Dabigatran etexilate
STADA® Nordic kapslar
dabigatranetexilat

- Du/vårdaren ska alltid ha detta patientinformationskort med dig/sig
- Se till att det är den senaste versionen

Bästa patient/vårdare

Du/ditt barn har påbörjat behandling med Dabigatran etexilate Stada Nordic. För att kunna använda Dabigatran etexilate Stada Nordic på ett säkert sätt bör du läsa den viktiga informationen i bipacksedeln.

Detta informationskort innehåller viktig information om din/ditt barns behandling. Se därför till att du/ditt barn alltid har med det. Informera vårdpersonal om att du/ditt barn tar Dabigatran etexilate Stada Nordic.

Information om Dabigatran etexilate Stada Nordic för patienter/vårdare av pediatrika patienter

Om din/ditt barns behandling

- Dabigatran etexilate Stada Nordic tunnar ut blodet. Det används för att behandla befintliga blodproppar eller förhindra att farliga blodproppar bildas.
- Följ din/ditt barnets läkares anvisningar när du/ditt barn tar Dabigatran etexilate Stada Nordic. Hoppa aldrig över en dos och sluta inte ta/ge Dabigatran etexilate Stada Nordic utan att först prata med din/ditt barns läkare.
- Informera din/ditt barns läkare om alla läkemedel som du/ditt barn tar.
- Informera läkaren om att du/ditt barn tar Dabigatran etexilate Stada Nordic innan du/ditt barn ska genomgå en operation eller andra ingrepp.
- Dabigatran etexilate Stada Nordic kapslar kan tas med eller utan mat. Kapseln ska sväljas hel med ett glas vatten. Kapseln får inte brytas sönder eller tuggas och kornen får inte tömmas ut från kapseln.

När du bör uppsöka läkare

- Blödningsrisken kan öka när du tar Dabigatran etexilate Stada Nordic. Kontakta genast läkare om du/ditt barn upplever tecken och symtom på blödning såsom svullnad, obehag, ovanlig smärta eller huvudvärk, yrsel, blekhet, svaghet, ovanliga blåmärken, näsblod, blödning i tandköttet, ovanligt långvarig blödning vid skärsår, onormalt mensflöde eller blödning från slidan, blod i urinen som kan vara rosa eller brun, röd/svart avföring, blodiga upphostningar, blodiga kräkningar eller kräkningar som liknar kaffesump.
- Vid fall eller skada, framför allt om huvudet skadas, kontakta genast läkare.
- Sluta inte att ta Dabigatran etexilate Stada Nordic utan att först prata med din/ditt barns läkare, om du/ditt barn upplever halsbränna, illamående, kräkningar, magbesvär, uppsvälld mage eller smärta i övre delen av buken.

Information om Dabigatran etexilate Stada Nordic för vårdpersonal

- Dabigatran etexilate Stada Nordic är ett oralt anti-koagulantium (direkt trombinhämmare).
- Behandlingen med Dabigatran etexilate Stada Nordic kan behöva avbrytas inför en operation eller annat ingrepp.
- Om större blödningshändelser uppstår måste behandlingen med Dabigatran etexilate Stada Nordic avbrytas omedelbart.
- Ett specifikt reverserande läkemedel (idarucizumab) finns tillgängligt för vuxna patienter. Effekt och säkerhet för det specifika reverserande läkemedlet, idarucizumab, har inte fastställts hos pediatrika patienter. För mer information och ytterligare råd om hur den antikoagulerande effekten av Dabigatran etexilate Stada Nordic kan motverkas, se produktresumén för Dabigatran etexilate Stada Nordic och idarucizumab.
- Dabigatran etexilate Stada Nordic utsöndras huvudsakligen via njurarna; adekvat diures måste upprätthållas. Dabigatran etexilate Stada Nordic kan dialyseras.

Fyll i denna del eller be din/ditt barns läkare att göra det

Patientinformation

Patientens namn

Födelsedatum

Indikation för antikoagulation

Dos av Dabigatran etexilate Stada Nordic